

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора  
\_\_\_\_\_ Е.А. Непоклонов  
\_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 2012 \_\_\_\_\_

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению препарата СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для кошек и котов  
для регуляции половой охоты

(организация-разработчик ООО «НПК «СКИФФ», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для кошек и котов (Sex Barrier<sup>®</sup> guttae ex catta et felis ).

Международное непатентованное наименование: мепрегенолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> в качестве действующих веществ в 1 мл содержит:

- для кошек мепрегенолацетата водорастворимого 1 мг и этинилэстрадиола 0,01 мг;

- для котов мепрегенолацетата водорастворимого 4 мг и этинилэстрадиола 0,2 мг;

вспомогательные вещества: оливковое масло (или ПЭГ- 400) - до 1 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой раствор светло-желтого, зеленовато-желтого или золотисто-желтого цвета.

3. Выпускают СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для кошек и котов расфасованным по 2, 3 и 5 мл в полимерные или стеклянные флаконы с капельницей. Флаконы плотно укупоривают крышками с контролем первого вскрытия и поштучно упаковывают в картонные коробки с инструкцией по применению.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для кошек и котов по истечении срока годности.

5. СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для кошек и котов следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакологическая группа: гормоны и их антагонисты.

СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для кошек и котов - гормональный контрацептивный лекарственный препарат, предназначенный для регуляции половой охоты.

Входящие в состав лекарственного препарата гестаген (мепрегенолацетат) и эстроген (этинилэстрадиол), воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и прекращается овуляция фолликулов. Этинилэстрадиол в комплексе с мепрегеноацетатом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, повышает вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность

сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки. У котом снижается уровень тестостерона, а, следовательно, половая активность

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

СЕКС БАРЬЕР® капли для кошек и котов по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных.

### III. Порядок применения

8. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для кошек и котов применяют: кошкам для угнетения полового возбуждения, прерывания и задержки течки, предотвращения нежелательной беременности; котам для угнетения полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории.

9. Препарат противопоказан беременным и кормящим кошкам, животным не достигшим половой зрелости, при новообразованиях молочной железы, половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

10. Препарат вводят перорально, капая в рот, на нос или на лакомство. Дозировка зависит от массы животного и цели применения (см. таблицу 1):

Таблица 1

Вид животного	Назначение препарата		Масса тела животного	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Кошки	Угнетение полового возбуждения	Прерывание течки	До 5 кг	4 капли 1 раз в день	3-5 дней	При первых признаках начала течки	1. Неэффективно применение препарата, если с момента начала течки прошло более 2-х дней 2. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.
			Свыше 5 кг	5-7 капель 1 раз в день			
		Задержка течки, поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	4 капли 1 раз в день	1 раз в месяц в течение 3 дней Для животных, продолжительность периода покоя которых менее 30 дней - 1 раз в 2	В период полового покоя, между течками	Продолжительность периода покоя может варьировать индивидуально в зависимости от темперамента, полового цикла, породы, возраста.

					недели, однократн о		
	Предотвращение нежелательной беременности		Независ имо от массы тела животно го	8 капель 1 раз в день	однокра тно	не позднее 24 часов после случайн ого спарива ния	Более поздний срок дачи препарата значительно снижает эффект воздействия.
Коты	Угнетени е полового возбужде ния и связанно го с этим агрессив ного поведе ния, мечения территории	Прерыва ние полового возбужде ния	До 5 кг	4 капли 1 раз в день	4-6 дней	При первых признак ах половог о возбужд ения	1. Неэффективно применение препарата, если с момента начала полового возбуждения прошло более 2-х дней 2. Молодым котам в первый день курса назначают 6-8 капель, далее по схеме. 3. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения половой охоты плюс 1 день.
			Свыше 5 кг	5-7 капель 1 раз в день			
		Поддерж а-ние успокои тельного эффекта	Независ имо от массы тела животн ого	4 капли 1 раз в день	1 раз в месяц в течение 3 дней.  Для животных , продолжи тель ность периода покоя которых менее 30 дней - 1 раз в 2 недели, однократн о	В период половог о покоя	Продолжительность периода покоя может варьировать индивидуально в зависимости от темперамента, полового цикла, породы, возраста.

Через 2-3 месяца после отмены препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

11. Симптомы передозировки не установлены.

12. Особенности действия при начале применения препарата и при его отмене не установлено.

13. Пропущенную дозу лекарственного препарата необходимо применить как можно скорее.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

14. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей Инструкцией побочных эффектов и осложнений, а также привыкания не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

15. Несовместимости с различными лекарственными препаратами не выявлено.

16. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для кошек и котов не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для кошек и котов следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время применения лекарственного препарата не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном попадании лекарственного средства внутрь – обратиться к врачу.

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50.

Адрес производства: ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50

Инструкция разработана ООО «НПК «СКИФФ», г. Москва.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 12 августа 2008 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения

Генеральный директор  
ООО «НПК «СКИФФ»

Л. М. Кокорина