

АНАНДИН инъекционный (ампула 2 мл)

СОСТАВ

1 ампула (2 мл) содержит 200 мг глюкаминопропилкарбакридона

СВОЙСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Действующее начало препарата "АНАНДИН" относится к новым органическим соединениям, не имеющим аналогов в мировой фармакологии. "АНАНДИН" обладает исключительно широким спектром биологического действия. "АНАНДИН" высокоактивен в отношении практически всех классов, как ДНК-, так и РНК-геномных вирусов (например, чума плотоядных, парвовирусный гастроэнтерит, вирусные гепатиты, энцефаломиелиты, полиэнцефалиты, ринотрахеиты и многие другие), а также стафилококковых инфекций и ряда грибковых поражений.

"АНАНДИН" рекомендуется в первую очередь, как специфический противовирусный препарат для лечения тяжелых вирусных инфекций различной локализации (дерматропные, нейротропные, пневмотропные и пантропные заболевания), а также инфекций, сопряженных с иммунодефицитными состояниями и, как следствие, появлением конкурирующей патологии иной природы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Препарат "АНАНДИН" применяют в ветеринарии при острых и хронических вирусных и бактериальных инфекциях, воспалительных заболеваниях, для ускорения регенераторных процессов, и при нарушении иммунной защиты организма. Лечение и профилактика всех форм чумы плотоядных, парвовирусного гастроэнтерита, гепатита, и других вирусных заболеваний. Лечение осложнений у животных, перенесших тяжелые вирусные заболевания. Эффективен также при лечении заболеваний, вызванных бактериальной флорой - в первую очередь, за счет повышения иммунной защиты организма.

ДОЗИРОВКА и СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

"АНАНДИН" вводят животным внутримышечно:

- С лечебной целью, в дозах: 10-20 мг/кг массы тела животного, один раз в день. Курс лечения - 3 дня подряд, При запоздалом лечении срок может быть продлен до 4-6 дней.
- Профилактически, в дозах: 5-10 мг/кг массы тела, однократно.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

"АНАНДИН" абсолютно нетоксичен ($LD_{50} = 4100$ мг/кг i.m.), не вызывает аллергических явлений и других побочных эффектов. Противопоказаний к применению препарата не установлено.

Лечение "АНАНДИНОМ" не является препятствием к применению антибиотиков, сульфаниламидов, гормонов, сыворотки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

"АНАНДИН" хранят в условиях, исключающих попадание света, при комнатной температуре в упаковке. Список Б. Гарантийный срок годности при указанных условиях хранения - 2 года со дня изготовления.

Ампула 2 мл

НИО МЕДИТЭР, Россия