



ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата Адвокат® для лечения и профилактики
гельминтозов и арахно-энтомозов у собак

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal
Health GmbH, Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Адвокат® (Advocate®).
Международное непатентованное наименование: имидаклоприд, моксидектин.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Адвокат® в 1 мл в качестве действующих веществ содержит имидаклоприд – 100 мг и моксидектин – 25 мг, а также вспомогательные вещества: спирт бензиловый – 807,3 мг, пропилен карбонат – 165,0 мг и бутилгидрокситолуен – 1 мг.
3. Лекарственный препарат выпускают в форме раствора (spot-on) расфасованным по 0,4; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полимерные пипетки, упакованные по 3 штуки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
4. Хранят Адвокат® в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30 °C.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.
Адвокат® по истечении срока годности не должен применяться.
5. Адвокат® следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Адвокат® относится к комбинированным противопаразитарным лекарственным препаратам.
Входящие в состав препарата активные компоненты обеспечивают его широкий спектр противопаразитарного действия в отношении демодекозных (*Demodex canis*), чесоточных (саркоптоидных - *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, *Otodectes cynotis*) клещей, блох (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalide canis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*), личиночных и половозрелых фаз развития нематод, включая *Toxocara canis*, *Toxascaris leonine*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Angiostrongylus vasorum*, *Crenosoma vulpis* и личинок L3 и L4 (микрофилярий) *Dirofilaria immitis*, паразитирующих у собак.

Имидаклоприд относится к группе хлороникотиниловых инсектицидов, механизм действия которых основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к гибели насекомых.

Моксидектин – полусинтетическое соединение группы милбемицинов (макроциклические лактоны), оказывая стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь с постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод.

После нанесения препарата на кожу имидаклоприд практически не всасывается, быстро распределяется по поверхности тела и, удерживаясь на эпидермисе и шерсти, оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие. Моксидектин хорошо всасывается, поступает в системный кровоток, органы и ткани, достигая максимальной концентрации в плазме крови на 4- 9 день, из организма выводится в течение 30 суток, в основном в неизмененном виде с фекалиями.

Адвокат® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76): ЛД₅₀ при пероральном введении белым мышам составляет более 1000 мг/кг, при накожном нанесении – более 4000 мг/кг массы животного; обладает слабо выраженным кумулятивными свойствами. В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и иммунотоксического действия; хорошо переносится собаками разных пород, включая колли и родственные породы собак. Препарат токсичен для рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

8. Адвокат® назначают собакам для лечения и профилактики демодекоза, отодектоза, саркоптоза, энтомозов, нематодозов (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез, аngиостронгилез, кренозомоз), профилактики дирофилиарии, а также в комплексной терапии блошиного аллергического дерматита.

9. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Адвокат® запрещается применять щенкам моложе 7-недельного возраста, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим собакам, а также животным других видов. Обработку собак массой менее 1 кг, беременных и кормящих сук, при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

10. Препарат применяют путем капельного (spot-on) нанесения на сухую неповрежденную кожу. Перед использованием с пипетки снимают защитный колпачок и, расположив ее вертикально, прокалывают защитную мембрану носика пипетки (надев колпачок с обратной стороны), затем колпачок снова снимают. Препарат, раздвинув шерсть, наносят животному в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи. При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 3-4 места. Минимальная терапевтическая доза препарата для собак составляет 0,1 мл/кг массы животного (10 мг/кг имидаклоприда и 2,5 мг/кг моксидектина).

В зависимости от массы животного используют пипетки с препаратом различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Таблица

Масса животного	Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл	Доза действующих веществ, мг/кг массы животного	
		имидаclоприд	моксидектин
до 4 кг	0,4	10	2,5
от 4 до 10 кг	1,0	10-25	2,5-6,25
от 10 до 25 кг	2,5	10-25	2,5-6,25
от 25 до 40 кг	4,0	10-16	2,5-4,0

При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчета 0,1 мл на каждый килограмм массы животного, используя комбинации пипеток различной фасовки.

Для уничтожения блох, вшей и власоедов обработку животных проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии – один раз в четыре недели на протяжении всего сезона наибольшей активности насекомых.

В комплексной программе профилактики и лечения аллергического дерматита, вызываемого блохами, Адвокат® применяют один раз в месяц.

Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют накожно однократно. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

С лечебной целью при саркоптозе препарат применяют один раз в месяц на протяжении двух месяцев, при демодекозе – один раз в месяц на протяжении 2-4 месяцев, в целях профилактики возможной инвазии обработки проводят 1 раз в месяц. При лечении осложненного демодекоза кратность применения Адвоката® увеличивают до 1 раза в неделю. Лечение рекомендуется проводить комплексно с применением этиотропных, патогенетических и симптоматических лекарственных средств.

Для дегельминтизации животных при нематодозах препарат применяют с лечебной целью однократно, с профилактической – один раз в месяц.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют в весенне-летне-осенний период: перед началом лета комаров (переносчиков возбудителя *D. Immitis*) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне не ранее, чем через 1 месяц после завершения лета насекомых. Адвокат® не уничтожает половозрелых дирофилярий, но снижает количество циркулирующих в крови микрофильярий, и может быть применён и инвазированным животным.

Препарат остается эффективным, даже если шерсть животного намокнет, тем не менее, не следует после обработки часто мыть животное с шампунем и/или сразу после нанесения препарата купать в водоемах, так как это может снизить его эффективность.

11. При передозировке препарата у некоторых собак могут наблюдаться угнетенное состояние, расширение зрачков, повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

12. Особеностей действия лекарственного препарата при первом применении и отмене не выявлено.

13. При обработке животных следует придерживаться рекомендуемых инструкцией интервалов. В случае пропуска очередной обработки, применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Адвокат® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

15. Не следует применять Адвокат® одновременно с другими противопаразитарными препаратами, в связи с возможным взаимным усилением токсичности.

16. Адвокат® не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Адвокат® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препа-

ратом Адвокат®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель компания «Bayer Animal Health GmbH»;
Адрес места производства: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Германия).

Инструкция разработана компанией «Bayer Animal Health GmbH» (Германия) совместно с ЗАО «Байер» (123022, Москва, Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Адвокат®, утвержденная Россельхознадзором 21.04. 2011 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения