

Инструкция рассмотрена и одобрена

Ветбиофармсоветом

«20» 10 2011 г.

Протокол № 60.

ИНСТРУКЦИЯ по применению таблеток «Альбазен 0,36»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Таблетки «Альбазен 0,36» - Tabulettae «Albazenum 0,36».

1.2 Препарат представляет собой таблетки плоскоцилиндрической формы, с гладкой поверхностью, от белого до кремового цвета, с вкраплениями темного цвета, слабого специфического запаха. На одной из поверхностей таблетки может быть нанесен знак R.

1.3 В одной таблетке содержится 0,36 г действующего вещества - альбендазола, вспомогательных веществ и наполнителей- до 1,0 г.

1.4 Таблетки выпускают в полимерной таре по 25; 50; 100; 250 и 500 таблеток или стрип-упаковке по 3; 6; 9; 12 и 15 таблеток.

1.5 Таблетки хранят в упаковке предприятия-изготовителя в защищенном от света и влаги месте при температуре не ниже 0°C и не выше +30°C.

1.6 Срок годности 3 (три) года от даты изготовления, при условии соблюдения условий хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Таблетки «Альбазен 0,36» - антигельминтик широкого спектра действия, обладает выраженным антигельминтным действием против нематод (как половозрелых, так и незрелых форм), цестод и trematod (только половозрелых).

2.2 Механизм действия заключается в нарушении углеводного обмена и микротубулярной функции гельминтов, что приводит к их гибели и выделению из организма животного.

2.3 Препарат малотоксичен, в терапевтических дозах не оказывает видимого побочного действия. Обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Таблетки «Альбазен 0,36» применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота овец, коз и диких жвачных животных при фасциолезе, мониезиозе, гемонхозе, трихострингилезе, буностомозе, стронгилоидозе, нематодирозе, хабертиозе, коопериозе, дикиоикаулезе, хиострингилезе, цистоикаулезе, мюллериозе; лошадей при параскариозе, оксиурозе, стронгилятозах и стронгилоидозе, свиней при аскариозе, метастронгилезе, эзофагостомозе; птиц при аскаридиозе, гетеракидозе.

3.2 Таблетки «Альбазен 0,36» задают внутрь индивидуально или групповым методом, однократно, вместе с кормом, без предварительного голодания.

3.3 Свиньям таблетки применяют в дозе 1 таблетка на 36 кг массы животного.

3.4 Овцам, козам таблетки применяют при нематодозах в дозе 1 таблетка на 72 кг массы животного; при фасциолезе, дикроцелиозе (половозрелые формы) в дозе 1 таблетка на 45 кг массы животного.

3.5 Крупному рогатому скоту и диким жвачным при нематодозах таблетки применяют в дозе 1 таблетка на 45 кг массы животного; при фасциолезе и дикроцелиозе в дозе 1 таблетка на 36 кг массы животного.

3.6 Птице таблетки применяют в дозе 1 таблетка на 36 кг массы птицы. Перед применением препарат измельчают.

3.7 Лошадям таблетки применяют в дозе 1 таблетка на 50 кг массы животного. Перед применением препарат измельчают.

3.8 При групповом способе применения, таблетки предварительно измельчают, смешивают с концентрированным кормом (из расчета корма на одно животное): для лошадей и крупного рогатого скота-0,5-1,0 кг; для овец, коз и свиней-150-200 г; для птиц-50 г. Полученную лекарственную смесь засыпают в кормушки на группу 10-100 животных, обеспечив к ним свободный подход.

3.9 Перед массовой дегельминтизацией каждую партию препарата предварительно испытывают на небольшой группе (5-10 животных, 50-100 птиц). При отсутствии осложнений в течение трех суток приступают к обработке всего поголовья.

3.10 Таблетки не разрешается применять при остром фасциолезе, во время случного периода, самкам в первую треть беременности, дойным истощенным животным.

3.11 Убой крупного рогатого скота, овец и коз на мясо разрешается через 14 дней, лошадей, свиней и птицы – через 7 дней после дегельминтизации. Молоко от дойных животных и яйца от кур несушек в течение четырех дней после дегельминтизации запрещается использовать для пищевых целей. Они могут быть использованы после термической обработки на корм животным. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным или для производства мясокостной муки.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать осторожность.

4.2 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3 После окончания работы с препаратом руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1 ООО «Рубикон», г. Витебск, Республика Беларусь

Инструкция по применению таблеток «Альбазен 0,36» разработана сотрудниками УО «ВГАВМ»: кафедры фармакологии и токсикологии доцентами Петровым В.В., Ятусевичем И.А., ассистентом кафедры паразитологии Петруковичем В.В., зав. кафедрой зоологии, доцентом Олехновичем Н.И.

Доцент кафедры фармакологии
и токсикологии УО «ВГАВМ»

В.В. Петров

