



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

30 ЯНВ 2013

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Аурикана[®] для лечения отодектоза у кошек и собак

(Организация-разработчик: «CEVA Sante Animale»/
«Сева Санте Анималь», Франция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Аурикан[®] (Aurikan[®]).
Международное непатентованное наименование: диазинон, преднизолон
натрия сульфобензоат, гексамидина диисетионат, тетракаина гидрохлорид.

2. Лекарственная форма: раствор аурикулярный (капли ушные).

Аурикан[®] в качестве действующих веществ в 100 мл содержит: диазинон – 0,05 г, преднизолон натрия сульфобензоат – 0,03 г, гексамидина диисетионат – 0,05 г, тетракаина гидрохлорид – 0,2 г, а также вспомогательные вещества: ксилометазолина гидрохлорид – 0,005 г, глицерин – 25 г, пропиленгликоль – 10 г и воду очищенную – до 100 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную слегка опалесцирующую жидкость.

3. Выпускают препарат в полиэтиленовых флаконах соответствующей вместимости с наконечником и завинчивающимся колпачком, упакованных в картонные коробки.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от света и влаги месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2,5 года со дня производства. Запрещается применение Аурикана[®] по истечении срока его годности.

5. Аурикан[®] следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Аурикан[®] относится к группе комбинированных лекарственных средств с акарицидным, антибактериальным, противовоспалительным и местноанестезирующим действием.

Диазинон – фосфорорганическое соединение кишечного действия, обладает выраженной акарицидной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития клещей, в том числе в отношении возбудителя отодектоза собак и кошек – *Otodectes cynotis*.

Преднизолон натрия сульфобензоат является синтетическим глюкокортикоидом с противовоспалительным и антиаллергическим действием. Он стабилизирует проницаемость клеточных мембран и препятствует выработке медиаторов воспаления.

Гексамидина диисетионат – катионовый антисептик из группы дибензамидина, обладает бактериостатическим действием против большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, способен сохранять свою активность в присутствии биологических субстанций организма (гной, кровь, серозная жидкость, кератин).

Тетракаина гидрохлорид – сильное местноанестезирующее средство.

Аурикан[®] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего и резорбтивного токсического действия. При попадании в глаза вызывают раздражение.

III. Порядок применения

8. Аурикан[®] применяют собакам и кошкам с лечебной целью при отодектозе, в т.ч. осложненном бактериальной инфекцией.

9. Противопоказанием к применению Аурикана[®] является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Избегать попадания лекарственного средства на конъюнктиву глаз, слизистые оболочки носа и ротовой полости.

10. Препарат закапывают в очищенный от корочек и экссудата слуховой проход в дозе: собакам до 15 кг и кошкам – по 5 капель, собакам от 15 до 30 кг – по 10-15 капель, собакам от 30 кг и выше – по 20-30 капель. После введения лекарственного средства ухо тщательно массируют.

Препарат применяют один раз в сутки в течение 7 дней, далее два раза в неделю в течение 1 месяца.

Капли обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения только одного.

11. Симптомы передозировки у собак и кошек не выявлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. При проведении лечения следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. При пропуске очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

14. При применении Аурикана® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Сведения о взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

16. Аурикан® не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Ауриканом® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Ауриканом®. При случайном попадании препарата на кожные покровы или в глаза их необходимо промыть большим количеством проточной воды, при попадании внутрь или появлении аллергических реакций следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или тарную этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.

Адрес места производства: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.

Инструкция разработана ООО «Сева Санте Анималь» совместно с компанией «Сева Санте Анималь» (Франция).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения: 250-3-36.12-1236 НТВЧ-3-36.12/

03902