

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



А. НЕПОКЛОНОВ

30 ИЮЛ 2014

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Больфо® ошейника для борьбы
с эктопаразитами собак и кошек
(организация-разработчик: компания «Bayer Animal
Health GmbH», Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Больфо® ошейник (Bolfo Collar).

Международное непатентованное наименование: пропоксур.

2. Лекарственная форма: инсектоакарицидный ошейник

Больфо® ошейник для собак крупных и средних пород в качестве действующего вещества содержит пропоксур – 4,442 г, и вспомогательные вещества: дибутил адипат – 9,495 г, диоктил фталат – 4,095 г, эпоксириновое масло сои – 1,035 г, стеариновую кислоту – 0,360 г, полихлорвинил – 25,515 г и смесь красителей – 0,059 г.

Больфо® ошейник для собак мелких пород и кошек, в качестве действующего вещества содержит пропоксур – 1,234 г, и вспомогательные вещества: дибутил адипат – 2,638 г, диоктил фталат – 1,138 г, эпоксириновое масло сои – 0,288 г, стеариновая кислота – 0,100 г, полихлорвинил – 7,088 г и смесь красителей – 0,016 г.

По внешнему виду препарат представляет собой полимерную ленту коричневого цвета с нанесенным номером серии и 2 или 3 петлями для фиксации.

3. Выпускают Больфо® ошейник для собак крупных и средних пород длиной – 70 см, для собак мелких пород и кошек – 38 см, в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, помещенных поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

4. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства.

Запрещается применение Больфо® ошейника по истечении срока годности.

5. Больфо ошейник следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Больфо® ошейник относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

Пропоксур (2-изопропоксифенил-N-метилкарбамат), входящий в состав препарата, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного, оказывая длительное инсектоакарицидное действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Пропоксур является активным ингибитором эстеразных систем организма членистоногих, стимулирует гликолиз и тормозит окислительное фосфорилирование, что приводит к нарушению биохимических процессов, параличу и гибели эктопаразитов.

Больфо® ошейник по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых условиях не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия. Токсичен для рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

8. Больфо® ошейник предназначен для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках, а также для защиты животных от их нападения, особенно в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).

9. Противопоказанием к применению Больфо® ошейника является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Больфо® ошейник не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также щенкам и котятм моложе 3-месячного возраста. Применение ошейника беременным и кормящим самкам при необходимости возможно после консультации с ветеринарным врачом.

10. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают, с внутренней стороны удаляют пластиковые перемычки и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем пропускают свободный конец ленты через петли и излишек срезают.

Непрерывное использование Больфо® ошейника обеспечивает защиту животных от иксодовых клещей на протяжении 2,5 месяцев, от насекомых – на протяжении 4 месяцев.

Действие лекарственного препарата проявляется через несколько часов, учитывая это, применение ошейника следует провести не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания эктопаразитов (парки, скверы, лес). В редких случаях при применении Больфо® ошейника возможно обнаружение иксодовых клещей на животном, но через 1- 2 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

Эффективность препарата зависит от состояния шерстного покрова, поэтому перед его применением животных с жесткой, спутанной или грязной шерстью, рекомендуется тщательно вымыть. Частый контакт с водой может

снизить эффективность Больфо® ошейника, поэтому перед купанием или мытьем животного его рекомендуется снять и вновь надеть, после того, как шерсть животного полностью высохнет.

В целях предотвращения повторной инфекации блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их Аэрозолем Больфо®.

11. При передозировке препарата у некоторых собак могут наблюдаться повышенная саливация, сужение зрачков, рвота, диарея. В этом случае ошейник снимают, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

13. Больфо® ошейник применяют непрерывно в течение сезона активности паразитов. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению его эффективности.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Больфо® ошейника в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. При случайном попадании частей ошейника внутрь у животного возможны симптомы отравления карбаматами (рвота, расстройство пищеварения, саливация), в этом случае рекомендуется применение средств симптоматической терапии и холинолитиков.

15. Не следует применять Больфо® ошейник одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

16. Больфо® ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Больфо® ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Больфо® ошейником. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель компания «Bayer Animal Health GmbH»; Адрес места производства: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Германия).

Инструкция разработана компанией «Bayer Animal Health GmbH» (Германия) совместно с ЗАО «Байер» (123022, Москва, Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1) .

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкцию по применению Больфо® ошейника, утвержденная Россельхознадзором 28.12.2011 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения