

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ДЕКОРА для лечения арахно-энтомозов у собак

(организация-производитель - ЗАО «Ветзвероцентр», Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Декор (Dekor).

Международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Декор содержит в качестве действующего вещества синтетический пиретроид – перметрин – 10%, а в качестве вспомогательных компонентов эмульгатор ТЭАС или ОП-7 (ОП-10) – 15%, диметилсульфоксид – 20%, масло касторовое – 5% и спирт этиловый до 100%. По внешнему виду представляет собой однородную маслянистую прозрачную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Смешивается с водой, образуя эмульсию молочно-белого цвета. Выпускают Декор расфасованным по 2; 5; 10; 20; 50; 70; 100 или 200 мл в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками или полимерные флаконы соответствующей вместимости.

3. Срок годности Декора при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Хранят Декор в упаковке производителя, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 10 0С до 300 С.

При понижении температуры хранения возможно образование в растворе кристаллов компонентов, которые постепенно растворяются с повышением температуры.

5. Декор следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Декор – инсектоакарицидный препарат. Перметрин, входящий в состав препарата является инсектоакарицидом кишечно-контактного действия, активен в отношении блох, вшей, власоедов, саркоптоидных и иксодовых клещей паразитирующих на плотоядных животных. а также возбудителей демодекоза собак. Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Декор по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и sensibilizing действия. Вызывает слабое раздражение слизистых оболочек.

Токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

8. Декор применяют для лечения плотоядных животных (собак, кошек, пушных зверей) при энтомозах (поражении блохами, вшами, власоедами), саркоптоидозах (отодектозе, саркоптозе, нотоэдрозе), демодекозе, а также при поражении иксодовыми клещами.

9. Не подлежат обработке больные и выздоравливающие животные, беременные самки, а также щенки и котята моложе 2-месячного возраста.

10. Для обработки животных при энтомозах и поражениях иксодовыми клещами предварительно готовят рабочую эмульсию. С этой целью Декор смешивают с водой из расчета 1 : 100. Затем на шерстный покров животного наносят приготовленную эмульсию, распределяют ее по всей поверхности тела и слегка втирают до полного смачивания шерстного покрова, избегая попадания на слизистые оболочки. Через 5-7 минут шерсть расчесывают гребнем и высушивают. Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще, чем 1 раз в 10 дней. Для предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их Декором в разведении водой 1:100, с нормой расхода 10 мл/м². В течение 3 дней не допускают контакта животного с обработанной подстилкой, а затем стирают ее с моющим средством.

9. При заболевании плотоядных животных саркоптозом, нотоэдрозом или демодекозом для лечения используют 1% водную эмульсию Декора (разведение 1:100), которую наносят тампоном на предварительно очищенные от струпьев и корок пораженные места из расчета 0,5 мл/кг массы животного, равномерно распределяя от периферии к центру с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см.

Для предотвращения слизывания препарата животным надевают намордник или смыкают челюсти петлей из тесьмы, которые снимают через 15 - 20 минут после нанесения препарата. Обработку проводят от 2 до 5 раз с интервалом 5 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

Животных с обширными участками поражения кожи обрабатывают в два приема с интервалом один день, нанося препарат сначала на одну половину пораженной поверхности туловища, а затем на другую.

При отодектозе (ушной чесотке) пушных зверей, собак и кошек наружный слуховой проход очищают смоченным рабочей эмульсией препарата тампоном от струпьев и корок и затем закапывают в каждое ухо по 3-6 капель 2% водной эмульсии (в зависимости от размера животного). С целью более плотной обработки всей поверхности уха и слухового прохода ушную раковину складывают вдоль пополам и слегка массируют ее основание.

Обработку проводят двукратно с интервалом 3-5 дней. В запущенных случаях отодектоза, осложненных отитами, назначают антибактериальные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют.

Декор обязательно вводят в оба уха, даже в случаях обнаружения клинических признаков отодектоза только в одном ухе.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких обработок курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

14. При применении Декора в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Декора с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Декор не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Декором следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует гладить животное и допускать его к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Декором. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО фирма «НПВиЗЦ «Ветзвероцентр», 129337, г. Москва, Хибинский проезд, 2