



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Федерального надзора

Е.А. Непоклонов

28 DEC 2011

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Интрасана для лечения маститов у коров

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Интрасан

Международное непатентованное наименование действующих веществ: диметилсульфоксид, калия йодид.

2. Лекарственная форма: линимент.

Интрасан в 100 г содержит в качестве действующих веществ 10 г диметилсульфоксида и 3 г калия йодида, а в качестве вспомогательных веществ натрия тиосульфат – 0,05 г, поливинилпирролидон – 0,3 г, твердый жир тип А – 30 г, эмульгатор №1 (Lanette SX) – 7 г и дистиллированную воду до 100 г. Интрасан по внешнему виду представляет собой однородную густую массу от белого до светло-желтого цвета.

Выпускают Интрасан расфасованным в полимерные тубы или банки.

3. Срок годности Интрасана при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять Интрасан по истечении срока годности.

4. Хранят Интрасан в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 4°C до 25°C.

5. Интрасан следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Интрасан — противовоспалительное средство для коров для наружного применения. Действующие вещества Интрасана легко проникают через кожу вымени вглубь органа, оказывают противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, антимикробное действие, нормализуют регенеративные процессы. Калия йодид восполняет также дефицит йода в организме.

По степени воздействия на организм Интрасан согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает местно-раздражающего, алергизирующего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

8. Интрасан применяют для лечения скрытых и клинических (серозных, катаральных, гнойно-катаральных) маститов у коров.

9. Противопоказанием для применения Интрасана является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Интрасан наносят на кожу каждой пораженной доли вымени после доения ровным тонким слоем, слегка втирая, в дозе 20-30 г 2 раза в сутки с интервалом 12 часов. При остром мастите продолжительность лечения составляет 7 дней, при хроническом мастите – 14 дней.

При необходимости курс лечения повторяют через 2 недели.

При лечении скрытых и серозных маститов Интрасан применяют как средство монотерапии, при катаральных и гнойно-катаральных маститах аппликации Интрасана сопровождают одновременными интрацистернальными или инъекционными введениями антибиотикосодержащих препаратов в соответствии с инструкциями по их применению.

11. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Интрасана в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

15. Интрасан совместим с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

16. Продукцию животного происхождения полученную от животных, обработанных Интрасаном в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Интрасаном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Интрасаном. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Инструкция разработана: ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения