

**Инструкция по применению гомеопатического препарата Лобелон
для лечения респираторных заболеваний у животных**
(Организация - разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Лобелон (Lobelon).

Международное непатентованное наименование: *Lobelia inflata*, *Apis mellifica*, *Kalium stibyltartaricum*, *Vincetoxcum*, *Atropa belladonna*, *Lycopodium clavatum*, *Psychotria ipescacuanha*, *Sambucus nigra*, *Kalium bichromicum*, *Ferrum phosphoricum*, *Echinacea purpurea*, *Acidum formicicum*, *Hepar sulfur*.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Лобелон содержит матричные настойки растительного и органического происхождения, и минеральные компоненты (в 1000 мл): *Lobelia inflata* Ø 0,15 мкл; *Apis mellifica* Ø=D1 0,1 мл; *Echinacea purpurea* Ø 15 мкл; *Vincetoxicum* Ø 0,02 мл; *Atropa belladonna* Ø 0,02 мл; *Lycopodium clavatum* Ø=D1 1 мкл; *Psychotria ipescacuanha* Ø=D1 1 мкл; *Sambucus nigra* Ø 15 мкл; *Kalium bichromicum* Ø=D2 0,5 мл; *Kalium stibyltartaricum* Ø=D2 5 пл; *Ferrum phosphoricum* D4 Trituration 0,5 г; *Acidum formicicum* Ø=D1 0,05 мл; *Hepar sulfur* D4 Trituration 0,01 г, а также в качестве вспомогательных компонентов: натрия хлорид 9,0 г; вода для инъекций до 1000 мл.

Выпускают Лобелон расфасованным по 10, 20, 50, 70, 100, 200 и 500 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.

Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства.

Запрещается применять по истечении срока годности.

II. Фармакологические свойства

Лобелон относится к комплексным гомеопатическим лекарственным препаратам. Обладает противовоспалительным, противокашлевым, антибронхоконстрикторным действием, регулирует продукцию бронхиальной слизи, улучшает легочную вентиляцию.

Входящие в состав лекарственного препарата в сверхмалых концентрациях биологически активные вещества растительного, минерального и органического происхождения стимулируют продукцию противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10, ИЛ-4), регулируют процессы хемотаксиса и продукцию ряда биологически активных веществ (ИЛ-1-бета, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа), играющих важную роль в развитии воспаления и бронхоспазма.

По степени воздействия на организм лекарственного средства Лобелон раствор для инъекций относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

Лобелон назначают с лечебной целью животным при респираторных заболеваниях дыхательных путей, в том числе инфекционной этиологии: ринофарингите, ларингите, трахеобронхите; бронхиальной астме (в составе комплексной терапии).

Противопоказанием к применению Лобелона раствора для инъекций является индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Лобелон вводят внутримышечно или подкожно. В острых случаях 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней. При хронических заболеваниях 2-3 раза в неделю.

Длительность курса лечения устанавливается врачом, но не более 1 месяца.

При необходимости курс повторяется.

Разовая доза Лобелона на одно животное составляет:

- лошадям 5,0-8,0 мл;
- крупному рогатому скоту, свиньям - 5,0 мл;
- козам, овцам - 2,5 мл;
- жеребят, телятам 2,5 мл;
- поросятам - 1 мл,
- собакам 1 мл/10 кг.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

В случае пропуска одной дозы препарата необходимо ввести ее как можно скорее. Далее интервал до следующего введения препарата не изменяется.

При применении Лобелона в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного в случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства, бета-адреномиметики, кортикостероиды или другое симптоматическое лечение.

Применение Лобелона не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Препарат предназначен для применения непродуктивным животным.

Сроки возможного использования продукции животноводства в период после применения Лобелона не регламентируются.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Лобелоном следует соблюдать общие правила личной гигиены и

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы с препаратом следует вымыть руки теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Лобелона следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустых флаконов из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.