



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Е.А. НЕПОКЛОНОВ

21 ИЮЛ 2014

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению вакцины Нобивак® Puppy DP  
против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита собак, живой  
сухой с растворителем Нобивак® Дилуент

(Организация-разработчик: компания Intervet International B.V./  
«Интервет Интернешнл Б.В.», Нидерланды)

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Торговое наименование: Нобивак® Puppy DP (Nobivac® Puppy DP),  
Нобивак® Дилуент (Nobivac® Diluent).

Международное непатентованное наименование: вакцина против чумы  
плотоядных и парвовирусного энтерита собак, живая сухая с растворителем.

2. Лекарственная форма — лиофилизированная масса (вакцина) и  
раствор для инъекций (растворитель).

Вакцина изготовлена из культуральной жидкости перевиваемых линий  
клеток VERO и FEF, инфицированных вирусами чумы плотоядных (штамм  
Ondersteopoort) и парвовирусного энтерита (штамм C154) с добавлением  
вспомогательных веществ: сorbitола (25 мг), гидролизата желатина (12,5 мг),  
панкреатического гидролизата казеина (12,5 мг), натрия гидрофосфата  
дигидрата (0,062 мг).

Вакцина поставляется вместе с растворителем Нобивак® Дилуент.

Стерильный растворитель представляет собой фосфатно-буферный  
раствор (рН 7,2-7,4), в состав которого входят натрия гидрофосфата дигидрат  
(0,31 мг), калия дигидрофосфат (0,21 мг), вода для инъекций (до 1 мл).

По внешнему виду вакцина представляет собой однородную сухую  
массу бледно-розового цвета, хорошо растворимую в Нобивак® Дилуент без  
образования хлопьев и осадка, растворитель — прозрачную бесцветную  
жидкость.

Вакцина расфасована по 1 прививной дозе ( $0,5\text{ см}^3$ ), растворитель по 1 мл  
в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Флаконы с вакциной и

растворителем вакуумированы, герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной и растворителем упаковывают по 10 штук в картонные или пластиковые коробки. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению вакцины. Коробки с вакциной и растворителем помещают в картонные ящики.

Срок годности вакцины — 24 месяца, растворителя — 60 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении срока годности вакцина и растворитель к применению не пригодны.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 до 8 °C, а растворитель при температуре от 2 до 25 °C.

5. Вакцину и растворитель следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной и растворителем без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также вакцина, не использованная в течение 30 минут после растворения, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 20 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

## II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина Нобивак® Puppy DP вызывает формирование иммунного ответа у щенков против возбудителей чумы плотоядных и парвовирусной инфекции собак через 10 дней после вакцинации продолжительностью 4 недели.

Каждая доза вакцины содержит не менее, чем  $10^{5,0}$  ТЦД<sub>50</sub> вируса чумы плотоядных (штамм Onderstepoort) и  $10^{7,0}$  ТЦД<sub>50</sub> парвовируса собак (штамм C154).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина Нобивак® Puppy DP предназначена для профилактики чумы плотоядных и парвовирусного энтерита у щенков.

9. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных.

10. Вакцинации подлежат клинически здоровые щенки, свободные от гельминтов, с 6-недельного возраста. При необходимости более ранней защиты, вакцинацию можно проводить с 4-недельного возраста.

Затем рекомендуется применение вакцин серии Нобивак® (Нобивак® DHPPi против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита и парагриппа собак, Нобивак® DHP против чумы плотоядных, инфекционного гепатита и парвовирусного энтерита собак, Нобивак® RL против бешенства и лептоспироза собак, Нобивак® Rabies против бешенства

животных, Нобивак® Lepto против лептоспироза собак) согласно указанной схеме.

**Рекомендуемая схема применения вакцин "Нобивак®"**

| Первая вакцинация |          | Повторная вакцинация       |                            |           |
|-------------------|----------|----------------------------|----------------------------|-----------|
|                   |          | 8-10 недель                | 12 недель                  | 14 недель |
| 4-6 недель        | Puppy DP | DHP<br>или<br>DHPPi + L    | DHP<br>или<br>DHPPi + L(R) | -         |
| 8-10 недель       |          | DHP<br>или<br>DHPPi + L    | DHP<br>или<br>DHPPi + L(R) | -         |
| 12 недель         |          | DHP<br>или<br>DHPPi + L(R) |                            | L         |

Во флакон с вакциной с помощью стерильного шприца вносят 1 мл растворителя, тщательно встряхивают и после растворения вводят животному подкожно с соблюдением правил асептики и антисептики.

Всех восприимчивых животных, которые содержатся в одном помещении, желательно вакцинировать одномоментно.

11. Симптомы проявления чумы плотоядных, парвовирусного энтерита собак или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлены.

12. Особенности постvakцинальной реакции при первичной иммунизации не установлены.

13. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики чумы плотоядных и парвовирусного энтерита.

14. Побочные явления и осложнения при применении вакцины Нобивак® Puppy DP в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не отмечаются. В случае возникновения у привитых животных реакции гиперчувствительности требуется провести симптоматическое лечение.

15. Допускается применение с другими вакцинами Нобивак® согласно рекомендуемой схеме.

16. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Нобивак® Puppy DP не устанавливаются.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды. При случайном введении препарата человеку необходимо обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands.

Инструкция разработана компанией Intervet International B.V. (Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands) совместно с ООО «Интервэт» (143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, ул. Промышленная д.81/1).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины Нобивак® Puppy DP против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита живой сухой с растворителем Нобивак® Дилуент, утвержденная Россельхознадзором 02.09.2011 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ ВГНКИ.

Номер регистрационного удостоверения: