

ОТИБИОВЕТ Капли ушные для собак и кошек (20 мл)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Комплексный препарат, в 1 мл которого содержится 0,5 мг триамцинолона ацетонида, 5 мг салициловой кислоты, 2 мг гентамицина сульфата и 0,125 мг карбетопендициния бромида, а также растворитель до 1 мл. Выпускают в форме раствора для наружного применения. При длительном хранении возможно помутнение раствора и образование осадка, который при встряхивании легко разбивается в равномерную взвесь. Расфасовывают по 20 мл в пластиковые флаконы, которые упаковывают в картонные коробки.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Триамцинолон ацетонид, входящий в состав препарата, оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и антиэкссудативное действие. Салициловая кислота проявляет кератолитическое, антисептическое, местнораздражающее и противовоспалительное действие. Карбетопендициния бромид активен в отношении грамположительных, а также некоторых грамотрицательных бактерий, обладает противогрибковым действием.

ПОКАЗАНИЯ

Назначают собакам и кошкам, а также другим непродуктивным животным для лечения острых бактериальных и грибковых инфекций наружного слухового прохода и поверхностных дерматитов, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат предназначен для наружного применения. Перед использованием флакон тщательно взбалтывают. При лечении отита предварительно очищают наружный слуховой проход, вводят 4 – 5 капель препарата в каждое ухо и легкими движениями массируют основание ушной раковины. В первые три дня лечения препарат используют 3 – 4 раза в день, далее кратность применения уменьшают до 2 – 3 раз в день. Длительность лечения, как правило, составляет 5 – 7 дней. После исчезновения клинических признаков заболевания лечение продолжают еще 2 – 3 дня. Общая продолжительность лечения не должна превышать 12 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.
Не рекомендуется использовать продуктивным животным.

ХРАНЕНИЕ

Флакон-капельница 20 мл
ВЕТФАРМ, Беларусь