



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

19 АВГ 2014

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Пиллкана 5, 20 для задержки и прерывания течки
у сук и кошек, снижения половой активности у кобелей

(организация-разработчик – «Ceva Sante Animale», Франция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата:
Пиллкан 5, 20 (Pillkan 5, 20)

Международное непатентованное наименование: мегестрол

2. Лекарственная форма: брикет (в форме сахарного кубика) для перорального применения.

Препарат выпускают в двух дозировках – Пиллкан 5 и Пиллкан 20.

Пиллкан 5 и Пиллкан 20 в качестве действующего вещества в одном брикете содержат мегестрола ацетат соответственно 5 мг и 20 мг, в качестве вспомогательного вещества сахарозу до 5,5 г.

3. Пиллкан 5, 20 выпускают расфасованным по 8 брикетов в пластиковых блистерах, которые упакованы в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

4. Хранить лекарственный препарат следует в упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °C до 25 °C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 4 года со дня производства.

Запрещается использовать лекарственное средство после окончания срока его годности.

5. Пиллкан 5, 20 следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Пиллкан 5, 20 относится к гормональным лекарственным препаратам.

Мегестрола ацетат, входящий в состав лекарственного препарата, обладает прогестероноподобными свойствами, подавляет секрецию в гипофизе гонадотропинов (лютеонизирующего и фолликулостимулирующего гормонов) путем прямого действия на гипоталамус.

В случае применения препарата самкам до начала течки он предотвращает овуляцию, а при применении в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее прекращению.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Мегестрола ацетат легко всасывается в кишечнике, биотрансформируется в печени и в течение 1 – 2 дней в виде глюкуроновых солей полностью выводится из организма животных с мочой.

По степени воздействия на организм Пиллкан 5, 20 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Ш. Порядок применения

8. Пиллкан 5 применяют сукам и кошкам для задержки и прерывания течки, кобелям для снижения половой активности и коррекции поведения, Пиллкан 20 применяют сукам и кобелям по тем же показаниям.

9. Применение Пиллкана 5, 20 противопоказано: сукам, начиная с 4 суток от начала течки, и кошкам, начиная с 2 суток от начала течки; неполовозрелым, беременным и лактирующим самкам, а также животным при заболеваниях печени и половой системы, при опухолях молочных желез, сахарном диабете, при гормональных нарушениях, при индивидуальной повышенной чувствительности к мегестролу ацетату.

10. Пиллкан 5, 20 скармливают животному с руки хозяина, добавляют в корм или воду для поения.

Кошкам Пиллкан 5 применяют:

- для прерывания течки при появлении первых поведенческих признаков течки, но не позднее 2 суток после ее начала в дозе 1 брикет 1 раз в день, в течение 8 дней;
- для задержки течки (в период анаэструса) – в дозе 0,5 брикета 1 раз в неделю в течение желаемого срока отсрочки течки, но не более 18 месяцев.

Перед началом нового курса применения рекомендуется сделать перерыв сроком не менее 2-х месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического полового цикла.

Рекомендации по применению препарата Пиллкан 5, 20 сукам:

Показания	Начало применения	Суточная доза		Порядок применения
		Пиллкан 5	Пиллкан 20	
Задержка течки	За 7 – 15 дней до начала течки	1 брикет на 10 кг массы тела животного	1 брикет на 40 кг массы тела животного	Суточную дозу дают ежедневно в течение желаемого срока отсрочки течки, но не более 32 дней. Течка начинается через несколько дней после прекращения дачи препарата.
Прерывание течки	Не позднее 3 дней после проявления признаков течки	1 брикет на 2,5 кг массы тела животного	1 брикет на 10 кг массы тела животного	Первые три дня дают суточную дозу, следующие 7 дней – половину суточной дозы.

Сукам лекарственный препарат рекомендуется применять не более двух раз в год.

Кобелям при появлении признаков сатириазиса (полового возбуждения) назначают Пиллкан 5 в дозе 1 брикет на 2,5 кг массы тела животного или Пиллкан 20 в дозе 1 брикет на 10 кг массы тела животного, в течение 8 дней. Последующие 8 дней Пиллкан 5 назначают в дозе 0,5 брикета на 2,5 кг массы тела животного или Пиллкан 20 в дозе 0,5 брикета на 10 кг массы тела животного.

11. Симптомы передозировки у собак и кошек не выявлены.

12. При приеме препарата у собак и кошек возможны повышение аппетита и увеличение массы тела.

13. Для достижения наибольшей эффективности препарата Пиллкан 5, 20 не рекомендуется нарушать схему применения препарата. В случае его отмены у животного восстановится физиологический половой цикл.

14. При назначении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений обычно не наблюдается. В отдельных случаях возможны рвота, летаргия, полидипсия/полиурия, увеличение молочных желез и лактация, эндометрит.

15. Длительное совместное применение Пиллкана 5, 20 с кортикоステроидами может подавлять работу коры надпочечников и вызывать сахарный диабет. Совместное применение Пиллкана 5, 20 с эстрогенами повышает вероятность развития пиометры.

16. Пиллкан 5, 20 не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Пиллканом 5, 20 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пиллканом 5, 20. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Упаковку из-под использованного препарата помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «Сева Санте Анималь», 10 авеню де ла Балластье, 33500, Либурн, Франция

Адрес места производства: ООО «НВЦ Агроветзащита С.-П», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1.

Инструкция по применению разработана ООО «Сева Санте Анималь», Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, тел. (495) 729-59-90.

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 28 ноября 2011 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения: