

ИНСТРУКЦИЯ по применению таблеток «Празитаб-плюс»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Таблетки «Празитаб-плюс» (Tablettae «Prazitab-plus»).
- 1.2 Препарат представляет собой таблетки плоскоцилиндрической формы с гладкой поверхностью, от бело-кремового до желтого цвета, допускается наличие вкраплений. На одной из поверхностей таблетки может быть нанесен знак R.
- 1.3 В одной таблетке содержится 0,05 г празиквантела, 0,144 г пирантела памоата (пирантела эмбоната), 0,15 г фебантела и вспомогательных веществ до 1,0 г.
- 1.4 Таблетки упаковывают в полимерную тару по 6, 9, 12, 15, 18 таблеток или в стрип-упаковку по 3, 6, 9, 12, 15 и 18 таблеток.
- 1.5 Таблетки хранят в упаковке изготовителя по списку Б в защищенном от света и влаги месте при температуре от 0°С до плюс 20°С.
- 1.6 Срок годности препарата 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Препарат обладает широким спектром антигельминтного действия на все стадии развития круглых и ленточных червей, в том числе: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Taenia spp.*, *Mesocestoides spp.*
- 2.2 Фебантел в организме животных подвергается гидролизу и образуется при этом активный метаболит - фенбендазол, который нарушает транспорт глюкозы у гельминтов и таким образом вызывают их гибель. Механизм действия празиквантела заключается в увеличении концентрации внутриклеточного кальция, что вызывает усиление сократительной активности мускулатуры плоских гельминтов, затем паралич и гибель паразита. Пирантела памоат, входящий в состав препарата обладает N-холиномиметическим действием в ганглиях, что приводит к активному сокращению мускулатуры нематод, а затем к параличу и гибели гельминта.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Препарат предназначен для профилактики и лечения собак при нематодозах (токсокароз, токсаскариоз, унцинароз, анкилостомоз) и цестодозах (тениоз, эхинококкоз, дипилидиоз, дифилоботриоз, мезоцестоидоз).
- 3.2 Таблетки задают внутрь, однократно из расчета 1 таблетка на 10 кг массы животного, в утреннее кормление с небольшим количеством корма (мясо, каша или мясной фарш). При необходимости таблетку можно измельчить. Предварительной диеты или соблюдения голодного режима, а так же применения слабительных средств не требуется.
- 3.3 С профилактической целью дегельминтизацию собак проводят ежеквартально, а так же перед вакцинацией и перед вязкой (за пять дней до вязки).
- 3.4 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Препарат не следует применять щенным сукам в первые двадцать дней беременности.
- 3.5 При передозировке таблеток и при повышенной индивидуальной чувствительности у собак может отмечаться тошнота, рвота, понос, угнетение, иногда возбуждение. При возникновении вышеуказанных побочных явлений применяют 0,1%-ый раствор атропина сульфата, подкожно, в дозе 0,05 мл/кг массы животного 2-3 раза в сутки и средства симптоматической терапии.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать осторожность.
- 4.2 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
- 4.3 После окончания работы с препаратом руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1 ООО «Рубикон», г. Витебск, Республика Беларусь

Инструкция по применению разработана сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (доцент Петров В.В., профессор Ятусевич И.А., доцент Голубицкая А.В.), старшим преподавателем кафедры паразитологии Петруковичем В.В. УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

