

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Септогеля для лечения мастита у коров, постхирургических осложнений, заболеваний кожи и слизистых оболочек у животных

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Септогель (Septogel) – лекарственное средство для лечения мастита у коров, постхирургических осложнений, заболеваний кожи и слизистых оболочек у животных.
  2. В 10 мл Септогеля содержится в качестве действующего вещества 0,65 г йодповидона (0,65% активного йода), а также вспомогательные компоненты.
  3. Септогель представляет собой гидрофильный гель красно-коричневого цвета со специфическим запахом йода.
  4. Септогель выпускают расфасованным по 2, 5, 10, 15, 25 и 50 мл в шприцы медицинские одноразовые, снабженные канюлей для интрацистернального введения и защитным колпачком или по 2, 5, 10, 15, 25, 30 и 40 мл в тубы, изготовленные из полиэтилена высокого давления. Шприцы с лекарственным средством по 3, 5 или 10 штук упаковывают в полиэтиленовый пакет с герметичным замком и снабжают инструкцией по применению. Тубы с лекарственным средством по 10 или 50 штук упаковывают в картонные коробки и снабжают инструкцией по применению. Каждую единицу первичной упаковки снабжают этикеткой с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; наименования лекарственного средства; объема лекарственного средства в шприце (тубе), мл; номера серии; срока годности (месяц, год); наименования и содержания действующего вещества; надписи «Для ветеринарного применения»; условий хранения.
- Лекарственное средство хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4°С до 20°С.
- Срок годности Септогеля при соблюдении условий хранения – 18 месяцев со дня изготовления. Септогель не должен применяться по истечении срока годности.

### 2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Септогель имеет широкий спектр антимикробного действия, соответствующий спектру активного йода. Обладает выраженным противовоспалительным и ранозаживляющим действием. К Септогелю, как к лекарственному средству, содержащему активный йод, отсутствует резистентность микроорганизмов.

### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Септогель применяют для лечения разных форм маститов у коров, постхирургических осложнений, заболеваний кожи и слизистых оболочек (кератита, конъюнктивита и вагинита) у животных.
  7. Для лечения мастита Септогель вводят интрацистернально в дозе 10 мл на четверть вымени:
    - при субклиническом и катаральном мастите 1-3 раза с интервалом 12 часов;
    - при фибринозном и гнойном мастите с интервалом 12 часов до клинического выздоровления (но не более 10 введений);
    - для профилактики мастита сухостойным коровам сразу после запуска однократно в каждую четверть вымени.Перед введением Септогеля необходимо освободить пораженную четверть вымени от содержимого, сосок продезинфицировать. Наконечник вводят в отверстие соскового канала и осторожным нажатием на поршень шприца выдавливают содержимое, после чего проводят легкий массаж четверти и соска в направлении снизу вверх.
  8. Введение Септогеля противопоказано животным с гиперчувствительностью к препаратам йода. Нельзя применять Септогель совместно с другими противовоспалительными средствами, вводимыми интрацистернально.
- Применение Септогеля разрешается не ранее, чем через сутки после последнего введения ранее применявшегося лекарственного средства. Не исключается применение других лекарственных средств системного действия

9. Для лечения постхирургических осложнений, заболеваний кожи и слизистых оболочек животных:

- на свежие, поверхностные раны, ссадины, трещины, после наложения швов, при воспалении ушитых ран, при вагинитах Септогель наносят тонким слоем на область поражения 1-2 раза в сутки до клинического выздоровления;

- при конъюнктивитах и кератитах Септогель наносят на конъюнктиву в дозе 0,5-1,0 мл 1-2 раза в сутки в течение 3-5 дней;

- при гнойных заболеваниях кожи и мягких тканей (фурункулов, абсцессов, флегмон) после вскрытия полостей и удаления гнойного содержимого тампон с лекарственным средством вводят в полость раны.

10. Молоко во время лечения из пораженных четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду, обеззараживают и уничтожают; молоко из остальных четвертей используют в корм животным после кипячения. В пищевых целях молоко используют сразу после клинического выздоровления животных, подтвержденного маститными тестами. Мясо при применении препарата используется без ограничений.

#### **4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

11. Все работы с лекарственным средством следует осуществлять с соблюдением правил личной гигиены и техники безопасности, предусмотренных при работе с ветеринарными лекарственными средствами.

12. Запрещается использование пустых шприцов, туб и пакетов из-под лекарственного средства для бытовых целей.

13. Септогель следует хранить в местах, не доступных для детей.

Номер регистрационного удостоверения ПВР-2-5.0/00528