

**Инструкция по применению гомеопатического препарата Утерогин
для профилактики и лечения послеродовых осложнений у коров
(Организация-разработчик ООО «АлексАнн», Московская область)**

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Утерогин (Uterogin).

Международное непатентованное наименование: Atropa belladonna, Cimicifuga racemosa, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Matricaria recutita, Secale cornutum, Hepar sulfuris, Calcium carbonicum Hahnemanni.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Утерогин в качестве действующих веществ содержит матричные настойки растительного, органического происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): Atropa belladonna Ø 0,2 мл; Cimicifuga racemosa Ø 45 мкл; Echinacea purpurea Ø 45 мкл; Hamamelis virginiana Ø 0,45 мкл; Matricaria recutita Ø 30 мкл; Secale cornutum Ø=D1 0,1 мл; Hepar sulfuris trit. D4 1 г; Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D4 1,5 мкг и вспомогательные вещества: натрия хлорид - 9 г, воду для инъекций до 1000 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

Выпускают Утерогин расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 3 года со дня производства.

После вскрытия флакона препарат хранения не подлежит.

Утерогин запрещается применять по истечении срока годности.

Утерогин следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Утерогин относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам.

Обладает противовоспалительным действием, усиливает сократительную активность и повышает тонус миометрия, улучшает кровоснабжение органов малого таза, стимулирует тканевой иммунитет и активизирует процессы регенерации слизистой матки.

По степени воздействия на организм Утерогин относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. Порядок применения

Утерогин применяют коровам в целях профилактики послеродовых осложнений и в комплексной терапии острого эндометрита.

Противопоказанием к применению Утерогина является индивидуальная непереносимость животным компонентов препарата.

Утерогин применяют коровам внутримышечно в разовой дозе 5 мл/животное:

- в целях профилактики задержания последа - однократно в течение 1 часа после отела;
- для стимуляции отделения последа при его задержании более 6 часов - однократно или двукратно с интервалом 12 часов;
- для лечения острого эндометрита - 1 раз в день в течение 4-6 дней.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

При применении Утерогина в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлении аллергических реакций, использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Применение Утерогина не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Продукция животного происхождения во время и после применения Утерогина может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Утерогином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

По окончании работы с препаратом следует вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Утерогина следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустых флаконов из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.