

ЭВИНТОН® - ИММУНОМОДУЛЯТОР

МЕЛКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ

Раствор для инъекций: под кожно или внутримышечно.

Разовая доза на одно животное составляет:

СОБАКАМ – 0,1 мл/1 кг массы животного,

КОШКАМ – 1,0 мл/животное.

Раствор для перорального применения: внутрь.

Разовая доза на одно животное составляет:

СОБАКАМ, КОШКАМ – 1 капля/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ	
Показания к применению	Практические рекомендации
Профилактика поствакцинальных осложнений, повышение иммунитета при вакцинации (обеспечение стойкого иммунитета)	Эвinton® инъекционный, первая инъекция в день прививки, вторая инъекция через 48 часов. Также можно вводить Эвinton® раствор для перорального применения 2 раза в день в течение 7-14 дней. Начинать прием Эвintonа® раствора для перорального применения нужно за неделю до прививки.
Иммунокоррекция в комплексной терапии инфекционных заболеваний	Эвinton® инъекционный 1-2 раза в день в течение 5-14 дней или Эвinton® раствор для перорального применения 2 раза в день в течение 7-14 дней.
Иммуносупрессия на фоне глистной инвазии	Эвinton® инъекционный 1 раз в день в течение 5-7 дней или Эвinton® раствор для перорального применения 2 раза в день в течение 7-10 дней.
Профилактика инфекционных заболеваний	При угрозе заражения Эвinton® инъекционный 1 раз в день в течение 5-7 дней или Эвinton® раствор для перорального применения 2 раза в день в течение 7-10 дней.
Вирусный папилломатоз	Эвinton® раствор для перорального применения 2 раза в день в течение 2-3 недель.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ

Раствор для инъекций: под кожно или внутримышечно.

Разовая доза на одно животное составляет:

КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ – 5 мл/животное,

ТЕЛЯТАМ – 2,5 мл/животное.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ	
Показания к применению	Практические рекомендации
Неспецифическая профилактика и лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний	Эвinton® 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней.
Для усиления иммунного ответа при вакцинации	Эвinton® однократно в день вакцинации.

ЛОШАДИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ

Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.

Разовая доза на одно животное составляет:

ЛОШАДЯМ – 8-10 мл/животное.

1-2 раза в сутки в течение 5-14 дней.