



## МЕДРО ПЕТ

для прерывания и задержки фазы половой охоты у кошек и сук, а также для коррекции поведения и снижения половой активности у котят и кобелей

**Состав:** синтетический прогестаген медроксипрогестерон (17-альфа-гидрокси-6-альфа-метилпрогестерона ацетат).

### ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Медроксипрогестерон** является синтетическим аналогом природного гормона прогестерона. Гормон блокирует секрецию гонадотропных гормонов и таким образом предупреждает или прекращает овуляцию и фазу эструса (течки) полового цикла самок; является конкурентным для тестостерона гормоном за счет подавления его синтеза, таким образом, корректируя поведенческие реакции самцов.

**Противопоказания:** период беременности и лактации, период половой незрелости; выявленные патологии репродуктивной системы, заболевания печени и поджелудочной железы; сахарный диабет или акромегалия; опухоли или новообразования различной этиологии; нарушения и патологии эндокринной системы.

### ДОЗИРОВКА

Выпускается по 10 таблеток.  
Таблетки со вкусом печени.

Показания	Дозировка	Период применения	Сроки применения
задержка течки у кошек	1 табл./нед	в период между течками, не применять беременным	не больше, чем 20 месяцев, первую течку пропустить
прерывание течки у кошек	1 табл./день	не позднее третьего дня после начала течки	3-5 дней подряд
коррекция поведения и снижение половой активности у котят	1 табл./день	_____	5-7 дней подряд, далее - 1 табл./нед
задержка течки у сук	для сук 2-7 кг: 2 табл. через день; для сук более 7 кг: 4 табл. через день	начало - за 7-15 дней до начала прогнозируемой течки	макс. курс - 30 дней, применять столько, сколько необходимо для откладывания течки
прерывание течки у сук	2 табл./день, для сук весом более 20 кг - 4 табл./день	не позднее 3-го дня после начала течки	3-4 дня подряд, далее - по 1 табл. (при весе более 20 кг - 2 табл.) ежедневно 12-14 дней
ложная беременность у сук	2-6 табл./день в зависимости от веса	_____	15 дней подряд
коррекция поведения и снижение половой активности у кобелей	2-6 табл./день в зависимости от веса	_____	4-5 дней подряд