

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А.ВЛАСОВ

18.12.2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек (МУЛЬТИФЕЛ-4)
(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалей, д. 16)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – МУЛЬТИФЕЛ-4

Международное непатентованное наименование – Вакцина против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек

2 Лекарственная форма – суспензия для инъекций (инактивированная вакцина). Вакцина МУЛЬТИФЕЛ-4 изготовлена из инактивированных формалином производственных штаммов вирусов панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивируса кошек, хламидий и адьюванта.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой прозрачную или слегка мутноватую жидкость, цвет которой может варьировать от светло-желтого до розового, с незначительным осадком на дне флакона, который при взбалтывании легко разбивается в гомогенную суспензию. Срок годности вакцины - 12 мес от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в течение 2 часов после вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 1,0 мл в стеклянные флаконы (ампулы) вместимостью 3,0 мл. Флаконы закупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками, ампулы герметично запаены. Во флаконе (ампуле) содержится одна доза вакцины. Флаконы (ампулы) с вакциной упакованы в картонные (пластиковые) коробки или блистеры, по 10 шт. в каждой. В каждую коробку (блистер) вложена инструкция по применению вакцины.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы (ампулы) с вакциной, подвергшиеся замораживанию, без этикеток, с нарушенной закупоркой и целостностью, измененным цветом вакцины, содержащие посторонние примеси или не разбивающийся при взбалтывании осадок, а также вакцину, не использованную в течение 2 часов после вскрытия флакона, выбраковывают и обезвреживают путем кипячения в течение 15 мин с последующей утилизацией. Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. МУЛЬТИФЕЛ-4 – иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у животных к панлейкопении, инфекционному ринотрахеиту, калицивирусу и хламидиозу через 14 сут после иммунизации, который сохраняется в течение 1 года.

Вакцина безвредна для животных всех возрастных групп, лечебными свойствами не обладает.

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее:

- калицивирус кошек	10^5 ТЦД ₅₀
- герпесвирус кошек	10^5 ТЦД ₅₀
- парвовирус кошек	$10^{3,0}$ ГАЕ
- Chlamydomphila felis	10^6 IFU

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза у домашних кошек и диких животных семейства кошачьих.

12. Вакцинации не подлежат клинически больные и/или ослабленные животные.

13. Перед применением в холодное время года вакцину подогревают до температуры (36-38) °С, в процессе применения флаконы (ампулы) с вакциной тщательно взбалтывают до образования однородной взвеси, исключая выпадения компонентов вакцины в осадок.

Вакцину вводят внутримышечно котят в 8-12-недельном возрасте с интервалом 21-28 суток в дозе 1,0 мл независимо от массы тела и породы кошек. Ревакцинацию проводят в возрасте 10-12 мес. Взрослых кошек вакцинируют ежегодно. Ранее не вакцинированных взрослых животных вакцинируют двукратно с интервалом 21-28 суток.

Вакцинацию проводят с соблюдением правил асептики, для инъекции используют только стерильные материалы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу.

14. Симптомов проявления панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

15. Особенности поствакцинальной реакции при первичной, повторной вакцинации и ревакцинации не установлено.

16. Не подлежат вакцинации кошки в последний месяц беременности и в первый месяц после родов и котята до 8-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза. В случае пропуска повторного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. На месте инъекции возможно появление быстро исчезающей припухлости. В случае проявления у отдельных животных аллергических реакций на введение вакцины для их снятия необходимо применять антигистаминные препараты.

19. Допускается одновременное применение вакцины против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек МУЛЬТИФЕЛ-4 с вакциной против вирусной лейкемии «ЛЕОМИНОР». Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

20. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины МУЛЬТИФЕЛ-4 не устанавливаются.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. В случае разлива вакцины зараженный участок пола заливают 5% раствором хлорамина или едкого натрия. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек (МУЛЬТИФЕЛ-4): ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек (МУЛЬТИФЕЛ-4), утвержденная Россельхознадзором 14 марта 2012 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения 44-1-5.12-2918 НПВР-1-2.1/00681