

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



09.02.2016

Н.А. ВЛАСОВ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Инсектал плюс ошейника
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

(организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Инсектал плюс ошейник (Insectal plus collar).

Международное непатентованное наименование: фипронил, перметрин.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Инсектал плюс ошейник содержит в качестве действующих веществ фипронил - 5% и перметрин - 1%, а в качестве вспомогательных веществ ПВХ-С-70-59-М, мел, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), краситель слоновая кость, диоксид титана, стеарат кальция, свинец сернокислый трехосновный.

3. По внешнему виду представляет собой полимерную ленту от светло-бежевого до светло-желтого цвета с фиксатором.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Запрещается применение Инсектал плюс ошейника по истечении срока годности.

4. Инсектал плюс ошейник выпускают для крупных собак длиной 75 см; средних собак длиной 65 см; для кошек, маленьких собак, щенков и котят длиной 40 см в индивидуальных герметично закрытых пакетах из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги, помещенных поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°C до 30°C.

6. Инсектал плюс ошейник следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа - инсектоакарицидное лекарственное средство.

10. Фипронил и перметрин, входящие в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, переносятся на кожно-волосистой покров животного и оказывают

контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия фипронила заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых рецепторах эктопаразита, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели членистоногих.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Инсектал плюс ошейник хорошо переносится животными, не обладает местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

III. Порядок применения

11. Инсектал плюс ошейник применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

12. Инсектал плюс ошейник запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Постоянное ношение Инсектал плюс ошейника обеспечивает защиту собак и кошек от иксодовых клещей на протяжении 3 месяцев, от насекомых - на протяжении 4 месяцев.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется надеть ошейник на животное за 2-3 дня до предполагаемого контакта с паразитами.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Инсектал плюс ошейника животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенностей действия в начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

16. Инсектал плюс ошейник запрещается применять кормящим и беременным самкам, щенкам и котятам моложе 4-месячного возраста.

17. Следует избегать нарушений режима применения Инсектал плюс ошейника, так как это может привести к снижению эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Инсектал плюс ошейника в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи, в этих случаях ошейник снимают, животное моют с мылом и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

19. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

20. Инсектал плюс ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Инсектал плюс ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Инсектал плюс ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

23. При случайном контакте ошейника с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Инсектал плюс ошейником. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Инсектал плюс ошейника, утвержденная Россельхознадзором 11.05.2012 года.

Наименование производственной производителя препарата для применения.

и адрес площадки лекарственного ветеринарного

ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-2113-3046 СТВР-3-3.8/02129