

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
 Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Дехинела Плюс таблеток со вкусом мяса
для лечения и профилактики гельминтозов собак

(организация-разработчик «KRKA d.d., Novo mesto», Словения)

I. Общие сведения.

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дехинел Плюс таблетки со вкусом мяса (Dehinel Plus tablets with meat flavour).

Международное непатентованное наименование: фебантел, пирантела эмбонат, празиквантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Дехинел Плюс таблетки со вкусом мяса в качестве действующих веществ содержит в 1 таблетке: фебантел 150 мг, пирантела эмбонат 144 мг, празиквантел 50 мг, а в качестве вспомогательных компонентов – лактозы моногидрат - 12,6%, кукурузный крахмал - 19,3%, повидон К30 2,6%, натрия лаурилсульфат - 0,3%, микрокристаллическую целлюлозу - 5,2%, кремния коллоидный ангидрид - 0,5% и магния стеарат - 1,0%, ароматическую добавку со вкусом мяса - 13,2%.

3. Выпускают Дехинел Плюс таблетки со вкусом мяса в виде круглых таблеток желтого цвета с темными вкраплениями, со скошенными краями и крестообразной насечкой с одной стороны, расфасованных в блистеры по 2, 4, 6, 10 и 20 штук. Блистеры упакованы в коробки по 1, 2, 4, 6, 10, 20, 30, 50 или 100 штук вместе с инструкцией по применению.

4. Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

5. Хранить лекарственный препарат следует в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства.

7. Дехинел Плюс таблетки со вкусом мяса обладает выраженным антигельминтным действием против нематод, цестод и третичных.

Фебантел, входящий в состав препарата относится к группе пробензимида-золов, умеренно всасывается из желудочно-кишечного тракта, биотрансформируется в печени. Производные фебантела вызывают у нематод угнетение синтеза белка тубулина и нарушение микротрубуллярной функции, одновременно тормозят активность фумарат редуктазы, являющейся ключевым ферментом в энергетическом обмене гельминтов, и прекращают транспорт и всасывание глюкозы, что вызывает гибель чувствительных гельминтов. Активен в отношении нематод родов *Ancylostoma*, *Uncinaria*, *Toxocara*, *Toxascaris*, *Trichocephalus*.

Пирантела эмбонат относится к группе пиразидинов, очень плохо всасывается при пероральном введении и оказывает свое действие преимущественно в желудочно-кишечном тракте собак. Обладает широким спектром нематоцидного действия. Блокирует у нематод нервно-мышечную передачу импульса и вызывает паралич мускулатуры гельминта; парализованные гельминты выводятся из желудочно-кишечного тракта хозяина перистальтикой. Активен в отношении нематод родов *Ascaris*, *Toxascaris*, *Ancylostoma*, *Uncinaria* и других.

Празиквантел относится к группе пиразинизохинолинов, при пероральном введении очень быстро и почти полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте, затем проходит через печень и выделяется с желчью в неизменном виде. Повреждает оболочку третичных паразитов и вызывает спастический паралич мускулатуры паразитов. Активен также в отношении цестод *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp.

Дехинел Плюс таблетки со вкусом мяса степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего и гепатотоксического действия.

III. Порядок применения

8. Дехинел Плюс таблетки со вкусом мяса применяют собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез) и цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, дифиллоботриоз, мезоцестодоз).

9. Не допускается применение лекарственного средства щенкам в первые три недели жизни и щенкам сукам в первые две трети периода беременности.

10. Препарат применяют собакам индивидуально перорально однократно в утреннее кормление из расчета 1 таблетка на 10 кг веса. Количество таблеток указано в таблице:

Масса собаки	Количество таблеток
Щенки и собаки маленьких пород	
0,5 – 5 кг	½ таблетки
6 – 10 кг	1 таблетка
Собаки средних пород	
11 – 15 кг	1½ таблетки
16 – 20 кг	2 таблетки
21 – 30 кг	3 таблетки
Собаки крупных пород	
31 – 40 кг	4 таблетки
41 – 50 кг	5 таблеток

Перед применением Дехинела Плюс таблеток со вкусом мяса не требуется голодной диеты и использования слабительных средств. В случае интенсивной инвазии нематодами рекомендуется повторное введение препарата через 14 дней в той же дозировке.

С лечебной целью животных дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально в терапевтической дозе.

11. Симптомы передозировки у собак не выявлены.

12. Особеностей действия препарата при его первом применении не установлено.

13. Побочных явлений и осложнений при применении Дехинела Плюс таблеток со вкусом мяса в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

14. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

15. Не допускается одновременное применение Дехинела Плюс таблеток со вкусом мяса с холинергическими лекарственными средствами (левамизол, пиперазин и др.), а также с фосфорорганическими соединениями.

16. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы следует тщательно вымыть руки с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку)

19. Пустые блистеры и коробки из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «KRKA d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovenija. Адрес Представительства фирмы «KRKA d.d., Novo mesto»: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13/43, 6 этаж.

Инструкция разработана фирмой «KRKA d.d., Novo mesto», Словения

Рекомендовано к регистрации в РФ ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию, утвержденную Россельхознадзором 11.02.2011 года.