

**Инструкция по применению препарата Кортаванс для симптоматического  
лечения дерматозов у собак, сопровождающихся зудом**  
(организация-разработчик: «VIRBAC S.A.», Франция)

**I. Общие сведения**

Торговое наименование лекарственного препарата: Кортаванс (Cortavance).

Международное непатентованное название: гидрокортизон.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Кортаванс в 1 мл в качестве действующего вещества содержит: гидрокортизон ацепонат - 0,584 мг, в качестве вспомогательного вещества: метиловый эфир полипропиленгликоля - до 1 мл.

По внешнему виду Кортаванс представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.

Кортаванс выпускают расфасованным по 76 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, закрытые пластиковой навинчиваемой крышкой. Каждый флакон упаковывают в индивидуальные картонные коробки, снабжают пульверизатором и инструкцией по применению лекарственного препарата.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года даты производства.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки - 6 месяцев.

Запрещается использовать Кортаванс по истечении срока годности.

Кортаванс хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 25°C.

Кортаванс следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

Кортаванс относится к гормональным препаратам группы глюкокортикостероидов.

**Гидрокортизон** - гормон, секретлируемый корой надпочечников.

Гидрокортизон оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное антиэкссудативное, противозудное действие; тормозит реакции гиперчувствительности, пролиферативные и экссудативные процессы в соединительной ткани и в очаге воспаления; уменьшает местную гиперемию и гипертермию кожи.

Механизм действия гидрокортизона заключается в подавлении активности различных разрушающих ткани ферментов - протеаз и нуклеаз, матриксных металлопротеиназ, гиалуронидазы, фосфолипазы, торможении синтеза простагландинов, кининов, лейкотриенов и других медиаторов воспаления из арахидоновой кислоты. Он также уменьшает проницаемость тканевых барьеров и стенок сосудов, тормозит экссудацию в очаг воспаления жидкости и белка, миграцию лейкоцитов в очаг

воспаления (хемотаксис) и пролиферацию соединительной ткани, стабилизирует клеточные мембраны, предотвращает перекисное окисление липидов и образование в очаге воспаления свободных радикалов.

При наружном применении гидрокортизон практически не всасывается в системный кровоток и накапливается в эпидермисе, оказывая преимущественно местное действие. Адсорбированная часть метаболизируется в эпидермисе и затем в печени. Выводится из организма преимущественно в форме неактивных метаболитов с мочой и желчью.

Кортаванс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### **III. Порядок применения**

Кортаванс применяют для симптоматического лечения дерматозов у собак, сопровождающихся зудом.

Кортаванс запрещается применять животным с язвенными поражениями и ранами на коже, при дерматитах бактериальной, грибковой и вирусной этиологии, в случае повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата.

Кортаванс наносят на кожу один раз в день при помощи пульверизатора с расстояния 10 см от обрабатываемой поверхности.

Доза гидрокортизона ацепоната составляет 1,52 мкг/см<sup>2</sup> пораженного участка; необходимая доза обеспечивается двукратным нажатием клапана пульверизатора на флаконе для обработки поверхности площадью 10x10 см.

Кортаванс применяют ежедневно в течение не более чем 7 дней.

Симптомы передозировки при применении препарата Кортаванс в соответствии с инструкцией не выявлены.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не установлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

При применении препарата Кортаванс в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В очень редких случаях могут возникать обратимые местные реакции в месте нанесения (эритема). В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства.

Применение Кортаванса не исключает использование других лекарственных препаратов, но не рекомендуется одновременно использовать другие препараты для местного применения.

Кортаванс не предназначен для применения продуктивным животным.

#### **IV. Меры личной профилактики**

При работе с препаратом Кортаванс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом необходимо вымыть руки с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Кортавансом. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: «VIRBAC S.A.», 06516 Carros, Ierc avenue 2065 m. L.I.D., France.