МАСТИЕТ ГОЛД (MASTIJET GOLD) Антибактериальный препарат (8 г)

Состав и форма выпуска
Антибактериальное лекарственное средство в форме стерильной суспензии для интрацистернального введения содержит в 1 шприце-дозаторе в качестве действующих веществ:

- 300 мг цефопирина (в форме натриевой соли),

- 20 мг преднизолона,

а в качестве вспомогательных веществ моностеарат глицерола, алюминосиликат кальция и натрия и арахисовое масло.

По внешнему виду Мастиет Голд представляет собой суспензию бело-желтого цвета. Выпускают Мастиет Голд по 8 г в стерильных пластиковых шприцах-дозаторах для интрацистернального введения, наконечники которых укупорены колпачками. Шприцы-дозаторы упаковывают по 20 штук в картонные коробки вместе с 20 очищающими салфетками и инструкцией по применению. Каждый шприц-дозатор и картонную коробку маркируют на русском языке с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия и назначения лекарственного средства, лекарственной формы, названия и содержания действующих веществ, даты изготовления и срока годности, номера серии, способа введения, условий хранения, надписей: «Для животных», «Для ветеринарного применения», «Стерильно», номера государственной регистрации и информации о подтверждении соответствия.

Фармакологические свойства
Цефопирин, основное действующее вещество препарата Мастиет Голд, обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий – основных возбудителей маститов коров, а именно *E.coli, S.uberis, S.oureus, Klebsiella spp, A.pyogenes, коагулозонегативных стафилококков, Sfi. dysgoloctiae, Sfr.agalacfioe* и др. Механизм действия цефопирина в бактериальной клетке заключается в ингибировании синтеза белков клеточной стенки.
Преднизолон, входящий в состав лекарственного средства, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени.
При введении лекарственного средства в молочные цистерны, действующее вещество быстро проникают в паренхиму вымени. В кровь из молочной железы действующие вещества всасываются в незначительной степени. Преднизолон и цефопирин выводятся из организма преимущественно с мочой и молоком. По степени воздействия на организм Мастиет Голд относится к группе малоопасных веществ (4 класс опасности по ГОСТ 1.007-76), не оказывает раздражающего действия на паренхиму вымени.

Показания
Назначают Мастиет Голд для лечения клинических и субклинических форм мастита у коров в период лактации. Показан собакам и кошкам для лечения отита и кожных инфекций.

Дозы и способ применения
Содержимое одного шприца (8 г) вводят интрацистернально в пораженную четверть вымени коров 2-4 раза с интервалом 12 часов. Порядок применения следующий:
• полностью сдоить пораженную четверть вымени;
• тщательно продезинфицировать сосок прилагаемой салфеткой;
• удалить верхушку колпачка с наконечника шприца, ввести наконечник в молочный канал на 5 мм, удалить шприц, пережать верхушку соска и ввести в пораженную четверть вымени, (или полностью удалить колпачок и ввести наконечник в сосковый канал на длину наконечника и выдавить содержимое шприца (1 дозу) в пораженную четверть вымени).

Для лечения отитов у собак и кошек. Обрабатывать внутреннюю пораженную поверхность ушной раковины 1 раз в день, при хроническом течении рекомендуется увеличить кратность.
Для лечения кожных инфекций. Пораженные участки кожи обрабатывать 2 раза в день методом наложения аппликаций.
Для лечения баланопоститов. Ввести содержимое одного шприца в препуциальный мешок и с помощью легкого массажа равномерно распределить препарат.

Побочные действия
При применении лекарственного средства в соответствии с инструкцией осложнений не выявлено.

Противопоказания
Мастиет Голд запрещено применять коровам, чувствительным к бетолактанным антибиотикам.

Особые указания

Ограничения на молоко 4 дня. Молоко из здоровых четвертей вымени от коров в период лечения и последующие 8 доек или 96 часов запрещается использовать для пищевых целей, оно может быть использовано для кормления животных после термической обработки. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения Мастиет Голд. В случае вынужденного убоя ранее указанного срока мясо животных можно использовать для кормления пушных зверей или производства мясокостной муки.

Меры личной профилактики

При работе с Мастиет Голд следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными средствами.
Все работы с лекарственным средством необходимо осуществлять с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки).
Людям, имеющим аллергическую реакцию на пенициллин, избегать попадания лекарственного средства на кожу.
По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Условия хранения

В закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 С до 25 С. Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 36 месяцев со дня изготовления. Мастиет Голд запрещено применять по истечении срока годности.