

# Ранозоль

## Состав и фармакологические свойства.

В качестве действующего вещества содержит фурацилин – 0,31%, этоний – 0,46%, а также вспомогательные вещества. Ранозоль относится к антисептическим и дезинфекционным препаратам наружного применения.

Фурацилин - противомикробное средство группы нитрофуранов, эффективное в отношении как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий, а также против некоторых вирусов и простейших.

Этоний – четвертичное аммониевое соединение, которое обладает бактериостатическим и бактерицидным эффектом в отношении стрептококков, стафилококков и других микроорганизмов. Оказывает детоксицирующее влияние на стафилококковый токсин. Обладает местно анестезирующей активностью, стимулирует заживление ран.

## Показания к применению.

Ранозоль применяют собакам, кошкам, пушным зверям, декоративным грызунам, а также спортивным лошадям и пони для лечения ран – асептических и инфицированных, операционных, обработки пуповины, культи хвоста, для первичной обработки ссадин, царапин, поверхностных ран и других мелких травматических повреждений, обеззараживания кожного покрова (операционное поле).

## Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

## Дозы и порядок применения.

Ранозоль наносят на пораженные участки кожи с помощью тампона или распыляют с расстояния 15-20 см. В зависимости от величины ран и свищей количество раствора должно быть таким, чтобы полностью смочить обрабатываемую поверхность с учетом затёков и полостей ран. Обработку проводят ежедневно до полного очищения ран от гнойно-некротических масс. Затем с началом процесса грануляции и заживления нанесение препарата осуществляют один раз в 2-3 дня. Курс лечения составляет 7-14 дней. При обработке кожи с целью обеззараживания, а также на свежие раны препарат наносят однократно.

## Побочные явления.

При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

## Хранение.

Хранят Ранозоль в закрытой упаковке производителя, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, в защищенном от света месте, недоступном для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°C до 30°C. Срок годности – 2 года со дня производства.

## Форма выпуска.

Полимерные флаконы по 80 мл с механической распылительной насадкой.