

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Сафродерм настойки в качестве антисептического, ранозаживляющего и противовоспалительного средства собакам и кошкам

(организация-производитель: ЗАО "Фирма НПВиЗЦ «Ветзвероцентр», г. Москва)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сафродерм настойка (Tinctura Saphroderm) – настойка лекарственных растений: крапивы двудомной и софоры японской на 70% этиловом спирте.
2. В состав настойки Сафродерм входят: настойка софоры японской и настойка крапивы двудомной, содержащие аскорбиновую кислоту, витамин К, каротиноиды, дубильные вещества, флавоноиды, эфирные масла, минеральные соли и другие биологически активные природные соединения.
3. Настойка представляет собой прозрачную жидкость светло-коричневого цвета с зеленоватым оттенком.
4. Выпускают Сафродерм настойку расфасованной по 10, 20, 50, 70, 100 и 200 см³ в стеклянных флаконах, закупоренных резиновыми пробками и обкатанных алюминиевыми колпачками, беспропеллентных и пропеллентных флаконах. Каждую первичную упаковку маркируют с указанием названия предприятия-изготовителя, его адреса и товарного знака, названия и состава препарата, количества препарата в упаковке, срока годности, условий хранения, номера серии, даты изготовления, обозначения стандарта организации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят настойку в закрытой заводской упаковке, в сухом, защищённом от света, недоступном для детей и животных месте, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 2 до 25 °С.

Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. Настойка по истечении срока годности не должна применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Входящие в состав препарата биологически активные вещества обладают противовоспалительными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими и антисептическими свойствами, способствуют активизации процессов эпителизации и регенерации повреждённых тканей.
6. По степени воздействия на организм Сафродерм настойка относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Сафродерм настойку назначают собакам и кошкам для лечения асептических и гнойных ран, ссадин и язв, а также отитов.

Для лечения асептических и инфицированных ран, порезов, царапин и язв настойку разводят кипяченой или дистиллированной водой (1:20) и применяют в виде орошения, промывания, влажных повязок или смазывания пораженной поверхности смоченным ватным тампоном или салфеткой. Обработку проводят два-три раза в день до выздоровления.

8. При отитах для удаления ушной серы, грязи и воспалительного экссудата ушные раковины и слуховой проход обрабатывают тампоном, смоченным настойкой, затем закапывают в каждое ухо

по 1-3 капли настойки и слегка массируют основание ушной раковины. Обработку проводят один-два раза в день в течение 3-7 дней до клинического выздоровления животного.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Сафродерм настойки собакам и кошкам в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

10. Противопоказаний не установлено.

11. Применение Сафродерм настойки не исключает использование антибактериальных и других лекарственных средств.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с настойкой Сафродерм следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными препаратами.

Инструкция разработана ЗАО Фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр "Ветзвероцентр", 129337, Москва, Хибинский пр-д, дом 2.

Рекомендован к применению в ветеринарии и регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».