

СТОП-ИНТИМ Таблетки для кошек (15 шт)

Особенности и преимущества

СОВРЕМЕННАЯ ФОРМУЛА СТОП-ИНТИМА оказывает мягкое контрацептивное действие на организм животного.

У самок препарат решает проблемы:

- НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ,
- ЗАДЕРЖКИ И ПРЕРЫВАНИЯ ТЕЧКИ,
- КОРРЕКЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ и др.

У самцов препарат решает проблемы:

- НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ,
- ПОВЫШЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ,
- МЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МОЧОЙ,
- АГРЕССИВНОСТИ и др.

Незаменим при:

- ВЫЕЗДЕ НА ДАЧУ,
- УЧАСТИИ В ВЫСТАВКАХ,
- ПЕРЕДЕРЖКАХ ЖИВОТНОГО ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ ХОЗЯИНА и др.

СТОП-ИНТИМ ТАБЛЕТКИ / STOP-INTIM TABULETTAE

Megestrol (мегестрол)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки для орального применения.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Стоп-Интим таблетки выпускаются в двух дозировках:

- Для кошек и котов (мегестрола ацетат – 5 мг/табл., вспомогательные компоненты),
- Для сук и кобелей (мегестрола ацетат – 20 мг/табл., вспомогательные компоненты).

Препарат выпускается в пластиковых банках с крышкой с контролем вскрытия по 15 таблеток в картонной пачке с инструкцией по применению.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Гормональный лекарственный препарат.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена и обладает свойством ингибировать секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормона, которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных с половым циклом, при недостаточном количестве ЛГ, процесс овуляции становится невозможным.

При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки. У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость у животного.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и выводится

из организма в виде солей с мочой в течение 1-2 суток.

Стоп-Интим таблетки по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Стоп-Интим таблетки назначают для регуляции половой у кошек и собак, в том числе для задержки и прерывания течки у самок кошек и сук, снижения половой активности и коррекция поведения у котят и кобелей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению Стоп-Интим таблеток является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет. Не следует применять препарат неполовозрелым животным, беременным и лактирующим самкам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Стоп-Интим таблетки применяют один раз в день индивидуально, перорально принудительно на корень языка или с небольшим количеством лакомства за 1-2 часа до кормления, с учетом показаний и пола животного.

Доза препарата зависит от вида, пола, массы животного и цели применения.

САМКИ:

Кошкам препарат применяют:

- с целью задержки течки – в период между течками один раз в неделю в дозе 1/2 таблетки или один раз в две недели в дозе 1 таблетка.

Курс применения – не более 18 месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического цикла.

- с целью прерывания течки кошкам препарат применяют при появлении ее первых признаков (но не позже чем через 3 дня от ее начала) в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ) на животное в день 5-7 раз с интервалом 24 часа (до исчезновения признаков течки плюс один день).

Сукам препарат применяют:

- с целью задержки течки за 7-15 дней до ее начала в дозе 1 таблетка (20 мг по ДВ) на 20 кг массы животного, ежедневно, но не более 32 дней подряд. В течение года не следует проводить более двух курсов применения препарата.

- с целью прерывания течки сукам препарат применяют при появлении ее первых признаков (но не позже чем через 3 дня от начала течки) в дозе 1 (20 мг по ДВ) таблетка на 10 кг массы животного.

Первые 3 дня сукам дают суточную дозу препарата, последующие 7 дней – 1/2 суточной дозы. В течение года рекомендуется проводить не более двух курсов применения препарата.

САМЦЫ:

Котам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ) на животное.

Первые 7 дней лекарственное средство дают ежедневно в суточной дозе, последующие 14 дней – 1/2 суточной дозы.

Кобелям для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в дозе 1 таблетка (20 мг по ДВ) на 10 кг массы животного.

Первые 7 дней кобелям дают суточную дозу препарата, последующие 14 дней – 1/2 суточной дозы.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы передозировки у животных не выявлены.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Стоп-Интим таблетки совместимы с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавками. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-Интим таблеток с кортикостероидами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2 °С до 25 °С. Лекарственное средство следует хранить в местах, недоступных для детей и животных.

Упаковка 15 табл.
АПИ-САН, Россия