ИНСТРУКЦИЯ по применению «СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для регуляции половой охоты у котов и кобелей

(организация-разработчик ООО «НПК «СКиФФ», г. Москва)

І. Общие сведения

- 1. Торговое наименование: «СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для котов и кобелей («Sex Barrier®» tabulettae pro felis et canis masculum). Международное непатентованное наименование: мепрегенолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол.
- 2. «СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для котов и кобелей гормональный контрацептивный лекарственный препарат для котов и кобелей в форме таблеток для перорального применения.

Лекарственный препарат в качестве действующих веществ содержит в одной таблетке (100 мг) мепрегенолацетата водорастворимого 0,4 мг и этинилэстрадиола 0,02 мг; вспомогательные вещества: сахар молочный 75,09 мг, крахмал картофельный 23,48 мг, кальций стеариновокислый 1,0 мг, краситель пищевой 0,01 мг.

Выпускают «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей расфасованным в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой, которую упаковывают в картонные коробки.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года от даты производства. Датой производства считают дату расфасовки.

«СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

- 4. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей хранят с предосторожностью в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.
- 5. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей следует хранить в недоступном для детей месте.
- 6. Неиспользованный лекарственный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакологическая группа: гормоны и их антагонисты.

«СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей - гормональный лекарственный препарат, предназначенный для регуляции половой охоты (угнетения полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории) у котов и кобелей.

Входящие в состав лекарственного препарата гормоны: гестаген - мепрегенола ацетат и эстроген - этинилэстрадиол, воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого снижается выработка тестостерона, что ведет к уменьшению половой активности.

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

«СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

- 8. Лекарственный препарат «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей применяют для регуляции половой охоты (угнетения полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории) у котов и кобелей.
- 9. Лекарственный препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, при новообразованиях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни, собакам породы грейхаунд и при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не рекомендуется давать котам и кобелям лекарственный препарат, предназначенный для кошек и сук вследствие различного гормонального фона мужских и женских особей.

10. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1

| Вид | Назначение ЛС | | Масса тела | Дозировка | Курс | Начало приема |
|---------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| животно | | | животного, | , , 1 | применен | 1 |
| го | | | КГ | | ия | |
| Коты | Регуляци | Угнетение | | | 1 раз в | Не позднее 2-х |
| | я половой | полового | До 5 кг | 1 таблетка | день в | дней с момента |
| | охоты | возбуждения | | | течение | начала половой |
| | | и связанного | 5,1 - 10 кг | 1-2 таблетки | 3-5 дней | охоты |
| | | с этим | | | | |
| | | агрессивного | | | | |
| | | поведения, | | | | |
| | | мечения | | | | |
| | | территории | | | | |
| | | Поддержание | Независимо | 1 таблетка | Регулярно | В период |
| | | успокаивающ | от массы | | 1 раз в 14 | полового покоя |
| | | его эффекта | тела | | дней | |
| | | | животного | | | |
| Кобели | Регуляци | Угнетение | до 5 кг | 1 таблетка | 1 раз в | Не позднее 2-х |
| | я половой | полового | | | день в | дней с момента |
| | охоты | возбуждения | 5,1-10 кг | 1-2 таблетки | течение | начала половой |
| | | и связанного | | | 3-5 дней | охоты |
| | | с этим | 10,1-30 кг | 2-4 таблетки | | |
| | | агрессивного | | | | |
| | | поведения | свыше 30 кг | 4+1 таблетка | | |
| | | | | на каждые | | |
| | | | | последующи | | |
| | | | | е 10 кг массы | | |
| | | | | тела | | |

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции животных.

- 11. Симптомы передозировки не установлены.
- 12. Особенностей действия при начале применения препарата и при его отмене не установлено.
- 13. Пропущенную дозу лекарственного препарата необходимо применить как можно скорее.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

14. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей Инструкцией побочных эффектов и осложнений, а также привыкания не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

- 15. Несовместимости с различными лекарственными препаратами не выявлено.
- 16. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При применении лекарственного препарата «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время применения лекарственного препарата не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

- 18. При случайном попадании лекарственного средства внутрь обратиться к врачу. Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое.
- 19. Использованные упаковки из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами
- 20. Организация-производитель: ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50.