



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

21 MAR 2013

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Чистотел каплей для борьбы с
эктопаразитами собак, кошек, щенков и котят

(Организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»,
пос. Томилино, Московская область)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел капли (Chistotel drops).

Международное непатентованное наименование: фипронил, перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Чистотел капли содержат в качестве действующих веществ фипронил – 5%, перметрин – 1%, а в качестве вспомогательных веществ диметилсульфоксид -10%, пропиленгликоль 400 – 33%, поливинилпирролидон – 3%, спирт изопропиловый до 100%. Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость светло-желтого цвета.

Выпускают Чистотел капли расфасованными в полимерные тубик-пипетки и полимерные флаконы-капельницы, которые упаковывают по 1-5 штук в блистеры и пачки из картона вместе с инструкцией по применению.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.

Чистотел капли по истечении срока годности не должен применяться.

4. Хранят Чистотел капли в упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0⁰С до 30⁰ С при относительной влажности не более 60 %.

5. Чистотел капли следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Чистотел капли относятся к группе инсектоакарицидных препаратов. Фипронил и перметрин, входящие в состав препарата оказывают контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setotus*), власоедов (*Trichodectes canis*), саркоптоидных и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия фипронила заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых рецепторах эктопаразита, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели членистоногих.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Чистотел капли по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

III. Порядок применения

8. Чистотел капли применяют собакам и кошкам, а также щенкам и котятм старше 3-месячного возраста при энтомозах (блохи, вши, власоеды) отодектозе, саркоптозе, нотоэдрозе, поражении иксодовыми клещами.

9. Чистотел капли запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим и беременным самкам, щенкам и котятм моложе 3-месячного возраста.

10. Препарат применяют животным путем капельного нанесения на сухую неповрежденную кожу. Раздвинув шерсть, препарат наносят на кожу животному в места, не доступные для слизывания - в области шеи у основания черепа или между лопатками в дозах, указанных в таблице.

Масса животного	Доза препарата, мл
Менее 2 кг	0,5
от 2 до 10 кг	1,0
от 10 до 20 кг	2,0
от 20 до 30 кг	3,0
от 30 до 40 кг	4,0

При обработке крупных собак массой более 40 кг Чистотел капли дозируют из расчета 0,1 мл/кг, нанося на кожу в 3-4 места.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц.

При отодектозе (ушной чесотке) в предварительно очищенные ушные раковины закапывают по 1-3 капли препарата. Через каждые 3-5 дней процедуру повторяют до выздоровления.

С лечебной целью при саркоптозе собак и нотоэдрозе кошек препарат применяют 2-4-кратно, с интервалом 7-10 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований; в целях профилактики возможной инвазии - 1 раз месяц. Лечение рекомендуется проводить комплексно с применением этиотропных, патогенетических и симптоматических лекарственных средств.

При нападении иксодовых клещей следует нанести препарат в количестве 1 капли непосредственно на клеща. Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют или обрабатывают подстилки инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

11. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел капль в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и при необходимости животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

16. Чистотел капли не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Чистотел каплями следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует мыть, гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 48 часов после обработки препаратом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел каплями. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

Инструкция разработана ЗАО «НПФ «Экопром», Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкцию по применению Инсектала-плюс, утвержденная Россельхознадзором 18.06.2007 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»