



Е.А.НЕПОКЛОНОВ

29 АПР 2014

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины Примодог для профилактики парвовирусного энтерита собак

(организация – разработчик: компания «Merial», Франция)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Примодог (Primodog).

Международное непатентованное наименование: Вакцина для профилактики парвовирусного энтерита собак.

2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.

Вакцина изготовлена из культуральной жидкости перевиваемой линии клеток CrFK, инфицированной парвовирусом собак (штамм CAG), с добавлением полипептидов, полиглицидов и гидролизата коллагена.

Вакцина по внешнему виду представляет собой опалесцирующую жидкость желтого цвета.

Вакцина Примодог расфасована по 1 мл (1 иммунизирующая доза) в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в коробки по 10 иммунизирующих доз (1 мл). В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

Срок годности вакцины 36 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замораживание вакцины не допускается.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с наличием посторонней примеси, выбраковывают и обеззараживают кипячением в течение 10 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

### II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина Примодог вызывает формирование иммунного ответа у собак к возбудителю парвовирусного энтерита через 14-21 сутки после введения, продолжительностью 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее  $10^{5,5}$  CCID<sub>50</sub> парвовируса собак.

Вакцина безвредна, не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия, безопасна при применении беременным и лактирующим животным; лечебными свойствами не обладает.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина предназначена для профилактики парвовирусного энтерита собак.

9. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных. За 10 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию собаки.

10. Вакцину Примодог вводят подкожно в область лопатки собакам с 6-недельного возраста двукратно с интервалом 6 недель, в дозе 1 мл независимо от массы и породы. При неблагоприятной эпизоотической ситуации допускается дополнительная инъекция через 2-3 недели после первого введения.

Ревакцинацию собак проводят через год, далее – каждые 2 года. При неблагоприятной эпизоотической ситуации рекомендуется ежегодная ревакцинация.

Для ревакцинаций допустимо использование моно- или поливалентной вакцины, содержащей парвовирус: Эурикан DHPPI2-L, Эурикан DHPPI2-LR или Гексадог производства компании «Merial».

При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики.

11. Симптомов проявления парвовирусного энтерита собак или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичной и повторных иммунизациях не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики парвовирусного энтерита собак. В случае пропуска очередного введения необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В исключительных случаях возможна анафилактическая реакция. В этом случае проводят симптоматическое лечение.

15. Данные о возможности использования вакцины Примодог одновременно с другими иммунобиологическими препаратами отсутствуют.

16. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Примодог не устанавливаются.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: «Merial», 29 av. Tony Garnier, 69007, Lyon, France.  
Адрес места производства: «Merial», Laboratoire Porte des Alpes, 69800 Saint Priest, France.

Инструкция разработана компанией разработана компанией «Merial» (Франция) и Бизнес-подразделением «Мериал» (г. Москва).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины Примодог, утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 30 сентября 2011 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».  
Номер Регистрационного удостоверения