

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

09.02.2016

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Секс-контроль С для регуляции  
половой охоты у кобелей и сук

(Организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром», 140070, Московская обл.,  
Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Секс-контроль С (Sex-Control С).

Международное непатентованное наименование: мегестрол.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Секс-контроль С в 1 таблетке содержит в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 20 мг, в качестве вспомогательных веществ – лактозу, крахмал, стеарат магния, желатин и краситель пищевой Е 161ж.

3. Препарат по внешнему виду представляет собой плоскоцилиндрические таблетки розового цвета (возможно с вкраплениями) с гладкой, ровной поверхностью, массой 110 мг.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства.

Запрещается применение Секс-контроль С после истечения срока годности.

4. Секс-контроль С выпускают расфасованным по 8, 10 или 20 таблеток в блистер или стрип, или в полимерную, или стеклянную банку с завинчивающейся пластмассовой крышкой, которые индивидуально упаковывают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Секс-контроль С следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Секс-контроль С относится к гормональным лекарственным препаратам.

10. Входящий в состав препарата синтетический гормон-прогестаген – мегестрола ацетат действует на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя секрецию гонадотропных гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), препятствует развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты. Применение препарата самкам до начала течки предотвращает овуляцию, а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день

течки) приводит к ее прекращению.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и в течение 48 часов выводится из организма животного с мочой.

Секс-контроль С по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности) согласно ГОСТ 12.1.007-76, в рекомендуемых дозах не оказывает тератогенного, сенсibiliзирующего и гепатотоксического действия.

### III. Порядок применения

11. Секс-контроль С назначают сукам для задержки и прерывания течки; кобелям – для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Не допускается применения Секс-контроля С при заболеваниях мочеполовой системы, онкологии и диабете.

13. Препарат применяют животным перорально на корень языка за 1 – 2 часа до кормления. Доза препарата зависит от пола животного и цели применения.

Сукам Секс-контроль С применяют:

– для задержки течки за 7 – 15 дней до ее начала ежедневно, но не более 32 дней, в дозе 1/4 таблетки на 10 кг массы тела животного;

– для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не позже, чем через 3 дня от ее начала, в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного. Первые 3 дня дают суточную дозу препарата, следующие 7 дней – суточную дозу снижают в два раза.

В течение года можно назначать не более двух курсов применения лекарственного препарата.

Кобелям препарат применяют для снижения полового возбуждения и коррекции поведения в первые 7 дней в суточной дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного, в последующие 14 дней – суточную дозу снижают в два раза.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

16. Не допускается применения неполовозрелым животным, беременным и лактирующим сукам.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Секс-контроля С в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено. При длительном применении Секс-контроля С или повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Секс-контролем С следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными

препаратами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Секс-контролем С. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

ЗАО «Научно-производственная  
фирма «Экопром»; Московская  
обл., Люберецкий район, поселок  
Томилино, ул. Гаршина, 11.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

ЗАО «Научно-производственная  
фирма «Экопром»; Московская обл.,  
Люберецкий район, поселок  
Томилино, ул. Гаршина, 11.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Секс-контроль С, утвержденная Россельхознадзором 03.10.2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-4.12-0627-ПВР-3-5.6/01741