

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Фиприст® Комбо для борьбы с
эктопаразитами у кошек и хорьков
(организация-разработчик «КРКА, д.д., Ново место», Словения)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: *ФИПРИСТ® КОМБО, раствор для наружного применения для кошек и хорьков, 50 мг/60 мг, 0,5 мл.*

Международное непатентованное наименование действующих веществ: Фипронил + (S)-Метопрен.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

ФИПРИСТ® КОМБО, раствор для наружного применения для кошек и хорьков, 50 мг/60 мг, 0,5 мл содержит в качестве действующих веществ фипронила - 50 мг, S-Метропена - 60 мг, а в качестве вспомогательных веществ: повидона К25 – 25 мг, полисорбата 80 – 25 мг, бутилгидроксанизола (Е320) - 0.1 мг, бутилгидрокситолуола (Е321) - 0.05 мг, этанола 96% - 39.7 мг, моноэтилового эфира диэтиленгликоля – достаточное количество до 0.5 мл.

3. ФИПРИСТ® КОМБО, раствор для наружного применения для кошек и хорьков, 50 мг/60 мг, представляет собой прозрачный желтый раствор без частиц.

Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 0,5 мл в одноразовые пипетки из полипропилена, закрытой крышкой с шипом из полиэтилена или полиоксиметилена. Пипетка из полипропилена закрыта пленкой, которую нужно проткнуть шипом.

Вторичная упаковка: каждая пипетка упакована в трехслойный пакет, в состав которого входит полиэстер, алюминий и полиэтилен. Картонная коробка содержит 1, 3, 6 или 10 пипеток.

4. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой заводской упаковке, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

6. Хранить лекарственный препарат следует в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фиприст® Комбо относится к комбинированным инсектоакарицидным лекарственным препаратам контактного действия. Содержит в качестве действующих веществ фипронил и S-метопрен.

10. Фипронил - инсектоакарицид группы фенилпипразолов, механизм его контактного действия заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

(S)-метопрен - аналог ювенильного гормона, регулятора роста насекомых; нарушая синтез хитина, вызывает аномалии развития насекомых на стадии яйца и личинки, предотвращает появление половозрелых насекомых на животных и в местах их содержания.

Фиприст® Комбо активен в отношении: блох (половозрелые и преимагинальные фазы развития) *Ctenocephalides spp.*; власоедов *Felicola subrostratus*, *Trichodectes canis*; иксодовых клещей (все фазы развития) *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes holocyclus*, *Haemaphysalis longicornis*,

Haemaphysalis flava, *Haemaphysalis campanulata*, *Haemaphysalis leachi*, *Amblyomma americanum*; комаров *Aedes aegypti*; саркоптоидных клещей *Sarcoptes scabiei var. canis*.

После нанесения на кожу действующие вещества постепенно распределяются по всей поверхности тела животного в течение 24 часов, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывают длительное контактное действие, обеспечивая защиту животного от эктопаразитов.

Однократная обработка животного обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 и 48 часов, соответственно. Защитное действие препарата против иксодовых клещей продолжается у кошек, собак и хорьков - до 4 недель; против половозрелых и преимагинальных фаз развития насекомых - у кошек и хорьков до 6 недель, у собак - 4 - 12 недель.

Фиприст® Комбо по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает кожнораздражающего и резорбтивно-токсического, эмбриотоксического и тератогенного действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения ветеринарного препарата

11. Фиприст® Комбо назначают кошкам и хорькам для лечения и профилактики энтомозов, вызываемых блохами, вшами и власоедами;

акарозов, вызываемых иксодовыми клещами; в комплексной терапии аллергического дерматита, вызываемого блохами, а также для предотвращения прикрепления и развития эктопаразитов на животных.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Запрещается применение Фиприст® Комбо больным инфекционными болезнями и ослабленным животным, котятм моложе 8-недельного возраста, собакам массой менее 2 кг, котятм массой менее 1 кг и хорькам в возрасте менее 6 мес.

13. Фиприст® Комбо применяют животным однократно путем топикального нанесения (спот-он) на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки. Перед обработкой кончик пипетки прокалывают перевернутым колпачком, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в области холки в одну или несколько точек в минимальной дозе 0,067 мл/кг, согласно таблице:

Вид животного Масса, кг	Объем пипетки и обозначение на упаковке	Содержание действующих веществ в 1 пипетке	
		Фипронила, мг	S-метопрена, мг
<i>Кошки, хорьки</i>	0,5 мл	50,0	60,0

Избегайте контакта препарата с глазами животного. Убедитесь, что препарат нанесен животному на область тела, недоступную для слизывания. Не допускайте обитающих совместно животных облизывать друг друга до полного высыхания препарата.

Не следует мыть и купать животных с моющими средствами, допускать животных в природные водоемы в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в 4 недели. В целях предотвращения повторной инфекации животных блохами рекомендуется обрабатывать всех животных, обитающих совместно, а также заменить подстилки или обработать их инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

14. При передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом

применении и отмене не выявлено. На шерсти животного может отмечаться влажное или масляное пятно на протяжении 24 часов после нанесения препарата.

16. Препарат разрешается применять животным, предназначенным для разведения, а также беременным и лактирующим самкам.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. Очень редко на месте нанесения препарата возможно склеивание шерсти, слабо выраженная реакция кожи (зуд, выпадение шерсти, покраснение кожи), при попадании препарата внутрь - чрезмерное слюноотделение. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости назначить антигистаминные препараты.

19. Фиприст® Комбо не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

20. Фиприст® Комбо не предназначен для обработки продуктивных животных.

IV. Меры личной профилактики

21. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Фиприст® Комбо следует использовать резиновые перчатки. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки. В течение 24 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

22. Не следует допускать к работе с препаратом лиц с признаками аллергических, респираторных и кожных заболеваний. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с Фиприст® Комбо.

23. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Организация-производитель: «КРКА д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501, Ново место, Словения.

Адрес Представительства фирмы КРКА в Казахстане: ТОО «КРКА Казахстан», 050059, г.Алматы, Бизнес центр Нурлы Тау, проспект Аль-Фараби 19, секция 1 Б, офис 207.

Инструкция разработана «КРКА д.д., Ново место», Словения.

Номер регистрационного удостоверения.