

АЛИЗИН® (Alizin®) Раствор для инъекций (10 мл)

Фармакологическая группа:

Гормоны и их антагонисты.

Входящий в состав Ализина® аглепристон представляет собой синтетический стероид, являющийся антагонистом прогестерона. Аглепристон блокирует рецепторы прогестерона в матке, нарушая нормальный физиологический процесс поддержания беременности у сук, что приводит к возникновению аборта или резорбции плодов. Способность связывания аглепристона с прогестероновыми рецепторами матки у собак в 3 раза выше, чем у прогестерона.

Аглепристон не изменяет концентраций прогестерона, простагландинов, окситоцина или кортизола в плазме крови в течение 24 ч после его введения, однако способствует высвобождению пролактина в течение 12 ч после инъекции. Максимальная концентрация аглепристона отмечается в крови через 2,5 суток после введения лекарственного препарата. Аглепристон биотрансформируется в печени и выводится из организма преимущественно с фекалиями.

Способ применения и дозировка:

Ализин® применяют для прерывания нежелательной беременности у собак в период до 45 суток после случайной вязки. Ализин® вводят собакам подкожно в область холки в дозе 10 мг/кг массы животного (0,33 мл раствора на 1 кг массы животного) двукратно с интервалом 24 ч.

Доза лекарственного препарата в зависимости от массы животного составляет:

Масса собаки, кг 3 6 9 12 24 30 42

Доза, мл 1,0 2,0 3,0 4,0 8,0 10,0 14,0

После введения лекарственного препарата необходимо слегка помассировать место инъекции.

Если объем вводимого раствора превышает 5 мл, то препарат нужно вводить в несколько точек.

Аборт (или резорбция плодов) наступает в течение 7 суток после введения Ализина®. В случае неполного аборта лечение может быть проведено повторно через 10 суток, в период между 30 и 45 днем после случайной вязки.

После применения Ализина® последующие течки проходят в соответствии с физиологической нормой.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к аглепристону. **Лекарственный препарат запрещается применять собакам с нарушением функции печени, почек и надпочечников, а также больным диабетом.**

Условия хранения

Ализин® хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 15°C до 25°C. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

После первого вскрытия флакона препарат можно применять не более 28 суток при соблюдении правил асептики и хранения при температуре от 3°C до 5°C.

Упаковка