

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



А. НЕПОКЛОНОВ

30 ИЮЛ 2014

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Аэрозоля Больфо® для борьбы с  
эктопаразитами собак и кошек

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal  
Health GmbH», Германия)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Аэрозоль Больфо® (Bolfo Spray).  
Международное непатентованное наименование: пропоксур.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения в аэрозольной упаковке.  
Аэрозоль Больфо® в качестве действующего вещества в 100 г содержит пропоксур – 0,25 г и вспомогательные вещества: ароматическую добавку – 0,1 г, лимонную кислоту обезвоженную – 0,0035 г, изопропанол – 34,6465 г, сжатые газы пропан – 9,75 г и бутан – 55,25 г. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.
3. Выпускают препарат расфасованным по 250 мл в металлических флаконах с распылительными головками и защитными колпачками.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup>С.  
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 5 лет со дня производства.
- Аэрозоль Больфо® по истечении срока годности не должен применяться.
5. Аэрозоль Больфо® следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### II. Фармакологические свойства

7. Аэрозоль Больфо® относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам.  
Пропоксур (2-изопропоксифенил-N-метилкарбамат), входящий в состав препарата, попадая на кожно-волосистой покров животного, оказывает длительное инсектоакарицидное действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.  
Пропоксур активный ингибитор эстеразных систем организма членистоногих, стимулирует гликолиз и тормозит окислительное фосфорилирование, что приводит к нарушению биохимических процессов, параличу и гибели эктопаразитов.

Аэрозоль Больфо<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании на слизистые оболочки вызывает слабое раздражение. Токсичен для рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

8. Аэрозоль Больфо<sup>®</sup> применяют для обработки собак и кошек при энтомозах и поражении иксодовыми клещами.

9. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Не следует обрабатывать Аэрозодем Больфо<sup>®</sup> больных инфекционными болезнями и выздоравливающих животных, а также щенков и котят до 3-месячного возраста. Применение беременным и кормящим животным возможно после консультации с ветеринарным врачом.

10. Перед использованием флакон с препаратом встряхивают и, нажимая на распылительную головку в течение нескольких секунд, распыляют аэрозоль с расстояния 30-40 см на туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть. Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, затем кончиками пальцев (в перчатке) препарат наносят на шерсть вокруг глаз и носа, после чего опрыскивают шею, туловище, конечности и хвост.

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), вдали от открытого огня и нагревательных приборов, предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами.

Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник или шейный воротник, которые снимают после полного высыхания кожно-волосного покрова.

В целях предотвращения выплода блох и повторной инфекации животного, подстилки, попоны и другие предметы ухода обрабатывают аэрозодем из расчета четыре кратковременных нажатия на распылительную головку на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности и через 1-2 часа очищают пылесосом.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в неделю.

11. При передозировке препарата у некоторых собак могут наблюдаться повышенная саливация, сужение зрачков, рвота, диарея. В этом случае животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении и отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях при повышенной индивидуальной чувствительности животного к препарату (избыточное слюноотделение, слезотечение) или появлении признаков раздражения кожи препарат следует смыть водой с мылом, а при необходимости обратиться к ветеринарному врачу.

15. Не следует применять Аэрозоль Больфо<sup>®</sup> одновременно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами для обработки животных.

16. Препарат Аэрозоль Больфо<sup>®</sup> не предназначен для применения продуктивным животным.



#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Аэрозолем Больфо® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, пользоваться резиновыми перчатками и респиратором (марлевой повязкой). Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Аэрозолем Больфо®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель компания «Bayer Animal Health GmbH»;  
Адрес места производства: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Германия).

Инструкция разработана компанией «Bayer Animal Health GmbH» (Германия) совместно с ЗАО «Байер» (123022, Москва, Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1) .

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкцию по применению Аэрозоля Больфо, утвержденная Россельхознадзором 20.06.2011 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения