

ВЕРАКОЛ (Veracol) Гомеопатический препарат - раствор для инъекций (100 мл)

ВЕРАКОЛ (Veracol)

Состав: Podophyllum D8; Arsenicum album D10; Veratrum album D8; Colocynthis D8

Podophyllum - широко применяется при заболеваниях пищеварительного тракта, печени и поджелудочной железы. Особенно эффективен при диспепсии и поносах у молодняка..

Arsenicum album - является одним из основных средств для лечения тяжелых гастроэнтеритов, в том числе у молодняка, язвенных стоматитов, острых гастритов, язвенной болезни желудка, токсической диспепсии новорожденных.

Veratrum – очень важное средство для лечения болезней, протекающих со рвотой, поносом и коллапсом, особенно при лечении тяжелых диспепсий, даже токсических форм.

Colocynthis - является незаменимым средством для лечения острых, рвущих спастических болей в желудке, печени, кишечнике, почках, репродуктивных органах, позвоночнике, конечностях.

ВЕРАКОЛ обладает специфическим воздействием на желудочно-кишечный тракт. Нарушения процесса пищеварения, а также болезни, вызванные этими нарушениями – основные показания для применения ВЕРАКОЛА. ВЕРАКОЛ эффективен при всех воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе инфекционной этиологии.

ВЕРАКОЛ:

- оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие, быстро восстанавливает перистальтику кишечника;
- восстанавливает функциональную способность фибринозного слоя слизистой кишечника, предотвращает дегенеративно-дистрофические процессы слизистой оболочки кишечника, изменение клеточного состава ворсинок эпителия и крипт;
- восстанавливает тканевой иммунитет и кишечный барьер;
- оказывает бактериостатическое действие на стрепто- и стафилококки, подавляет рост условно-патогенной микрофлоры и способствует колонизации нормофлоры;
- восстанавливает функцию печени, которая нередко страдает при желудочно-кишечных заболеваниях.

Показания к применению:

1. Острая и хроническая диарея
2. Гастрит, гастроэнтерит, в т.ч. инфекционной этиологии
3. Метеоризм, дискинезия, кишечные колики
4. Кишечный дисбактериоз
5. Расстройство пищеварения в результате погрешностей в кормлении, отравления
6. Нарушение секреции желез тонкого и толстого кишечника

Продолжительность лечения от 1-2 инъекций (острая диарея, кишечные колики) до нескольких недель (тяжелые поражения желудочно-кишечного тракта).