

## ГЕСТРЕНОЛ Капли для котов с кошачьей мятой (1,5 мл)

### Общие сведения

Торговое наименование: Гестренол капли (Gestrenol guttae).

Международное непатентованное наименование: пропионат мепрегенола и этинилэстрадиол.

Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Лекарственный препарат Гестренол капли для котов в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: пропионат мепрегенола - 4,00 мг и этинилэстрадиол 0,20 мг; в качестве вспомогательных веществ: соевое масло, вкусовую добавку.

По внешнему виду препарат представляет собой раствор от желтого до желто-зеленого цвета.

Выпускают Гестренол капли расфасованным по 1; 1,5; 2; 3 и 5 мл в полимерные флаконы с капельницей, укупороенные крышками с контролем первого вскрытия.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C. Во время транспортировки допускается кратковременное замораживание препарата, который не теряет своих характеристик после оттаивания.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата Гестренол капли по истечении срока годности.

Гестренол капли следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### Фармакологические свойства

Гестренол капли для котов - гормональный контрацептивный лекарственный препарат, предназначенный для регуляции половой охоты у самцов.

Входящий в состав лекарственного средства гестаген - пропионат мепрегенола блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберины (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий рилизинг гормоны), которые являются пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за угнетение половых рефлексов и сперматогенез. Этинилэстрадиол в комплексе с пропионатом мепрегенола усиливает контрацептивный эффект.

Пропионат мепрегенола и этинилэстрадиол быстро всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

Препарат по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

В рекомендованных дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных.

### Порядок применения

Препарат применяют котам - для угнетения полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории.

Препарат противопоказан котам, не достигшим половой зрелости, при новообразованиях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата.

Гестренол капли для котов вводят перорально, капая в рот, на нос или на лакомство.

Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения:

Цель применения / Вес кота, кг / Дозировка / Курс применения / Начало приема

Прекращение половой охоты / до 5 / 4 капли / 1 раз в день в течение 3-5 дней / При появлении первых признаков половой охоты

Прекращение половой охоты / 5,1-10 / 4-8 капель / 1 раз в день в течение 3-5 дней / При появлении первых признаков половой охоты

Поддержание успокаивающего эффекта / Независимо от веса / 4 капли / Регулярно 1 раз в 10-14 дней / В период полового покоя

Примечания:

1. Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней.

2. Молодым котам в первый день курса назначают 2 таблетки, далее по схеме.

3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день.

4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.

Через 2-3 месяца после отмены препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

Симптомы передозировки не установлены.

Особенностей действия при начале применения препарата и при его отмене не установлено.

При применении препарата в соответствии с настоящей Инструкцией побочных эффектов и осложнений, а также привыкания к препарату не наблюдается.

Несовместимости с различными группами лекарственных препаратов не выявлено.

Пропущенную дозу лекарственного препарата необходимо применить как можно скорее. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

Гестренол капли не предназначены для применения продуктивным животным.

### **Меры личной профилактики**

При работе с лекарственным препаратом Гестренол капли следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время применения препарата не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном попадании лекарственного средства внутрь - обратиться к врачу.

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.