

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Е.А. НЕПОКЛОНОВ

04 МАР 2014

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Линимента синтомицина 5 %
для лечения заболеваний кожи и слизистых оболочек у животных

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Линимент синтомицина 5 % (Linimentum Synthomycini 5 %).

Международное непатентованное наименование: хлорамфеникол.

2. Лекарственная форма: линимент для наружного применения.

Линимент синтомицина 5 % содержит в 100 г в качестве действующего вещества 5 г синтомицина, а в качестве вспомогательных веществ – 20 г масла касторового; 7 г эмульгатора № 1; 0,6 г натрия-карбоксиметилцеллюлозы очищенной; 0,2 г кислоты сорбиновой; воды очищенной — до 100 г.

По внешнему виду препарат представляет собой однородную массу от белого до светло-желтого цвета.

3. Выпускают Линимент синтомицина 5 % стерильно расфасованным в полимерные банки или тубы, закрытые полимерными крышками с контролем вскрытия.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

Срок годности Линимента синтомицина 5 % при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применять Линимент синтомицина 5 % по истечении срока годности.

5. Линимент синтомицина 5 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Линимент синтомицина 5 % относится к фармакотерапевтической группе антибактериальных препаратов для лечения заболеваний кожи и слизистых оболочек.

Антибиотик синтомицин, входящий в состав мази, оказывает антимикробное, противовоспалительное действие, ускоряет процесс заживления ран.

По степени воздействия на организм Линимент синтомицина 5 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

8. Линимент синтомицина 5 % применяют животным для лечения гнойных ран, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек, язв, ожогов у животных.

9. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

10. Линимент синтомицина 5 % применяют животным наружно, нанося ровным тонким слоем на область поражения, или намазывают на стерильную марлевую салфетку и фиксируют на ране. Повязки меняют 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от тяжести и характера повреждений. При необходимости предварительно проводят туалет раны. Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

11. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Линимента синтомицина 5 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении признаков раздражения кожи линимент снимают тампоном и обработку прекращают.

15. Линимент синтомицина 5 % не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами для местного применения.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Линиментом синтомицина 5 %, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Линиментом синтомицина 5 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Линиментом синтомицина 5 %. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Инструкция разработана: ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Линимента синтомицина 5 %, утвержденная Россельхознадзором 3 ноября 2008 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 24-3-36.13-1843 ДПВР-3-1.9/00164