



Заместитель Руководителя
Российского Балзора

Е.А. Непоклонов

11 СЕН 2013

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мази ихтиоловой 10 %
для лечения заболеваний кожи у животных

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь ихтиоловая 10 %
(Unguentum Ichthyoli 10 %).

Международное непатентованное наименование: ихтаммол.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь ихтиоловая 10 % в 100 г в качестве действующего вещества содержит ихтаммол - 10 г, а в качестве вспомогательного вещества вазелин - 90 г.

По внешнему виду препарат представляет собой густую однородную массу темно-бурого цвета с характерным запахом.

3. Выпускают Мазь ихтиоловую 10 % стерильно расфасованной в полимерные банки или тубы.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

Срок годности Мази ихтиоловой 10 % при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применять Мазь ихтиоловую 10 % по истечении срока годности.

5. Мазь ихтиоловую 10 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мазь ихтиоловая 10 % относится к фармакотерапевтической группе препаратов для наружного применения при заболеваниях кожи.

Ихтаммол, входящий в состав мази, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При нанесении на пораженную поверхность суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани. В рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, аллергизирующего и резорбтивно-токсического действия.

По степени воздействия на организм Мазь ихтиоловая 10 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

8. Мазь ихтиоловую 10 % применяют животным (кроме кошек) для лечения заболеваний кожи (ожогов, ран, экзем, дерматитов).
9. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).
10. Мазь ихтиоловую 10 % применяют животным наружно, нанося ровным тонким слоем на пораженную поверхность кожи 1 - 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.
11. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.
12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.
13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо возобновить применение препарата как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.
14. Побочных явлений и осложнений при применении Мази ихтиоловой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение мази прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты.
15. Мазь ихтиоловую 10 % не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.
16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью ихтиоловой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мазью ихтиоловой 10 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью ихтиоловой 10 %. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази ихтиоловой 10 %, утвержденная Россельхознадзором 22 мая 2008 года.