

Поливак-ТМ вакцина против дерматомикозов собак инактивированная, НАРВАК, Россия (0,6 мл)

Применяется при дерматофитозах собак, возбудителями которых являются грибы родов Трихофитон и Микроспорум

Инструкция по применению Поливак-ТМ вакцины против дерматомикозов собак

Описание: Вакцина ПОЛИВАК-ТМ является безопасным и высокоэффективным средством специфической профилактики и лечения микроспории и трихофитии семейства псовых, кошачьих и др. домашних и сельскохозяйственных животных.

ПОЛИВАК-ТМ — ассоциированная инактивированная вакцина против дерматомикозов животных включает грибы из рода Трихофитон (стригуший лишай) и Микроспорум.

Вакцина адаптирована специально для применения на собаках.

Одна доза вакцины содержит не менее 20 млн. микроконидий в 1 см³.

Общие сведения: Вакцина Поливак-ТМ против дерматомикозов собак инактивированная, включает 8 видов и разновидностей грибов из рода Трихофитон и Микроспорум и предназначена для профилактической и лечебной вакцинации собак. Вакцина и упаковка адаптированы специально для применения на собаках. По внешнему виду вакцина представляет собой однородную жидкость светло-коричневого цвета стойким осадком на дне, легко взбалтываемым при встряхивании.

Вакцину выпускают в герметически закрытых флаконах или ампулах, содержащих 1 или 2 коммерческих доз (1 коммерческая доза составляет 0,6 см³). Каждая единица фасовки должна иметь маркировку с указанием на ампулах — названия препарата, номера серии и контроля, даты изготовления (мес., год), срока годности, объема препарата в ампуле и обозначения технических условий; на флаконе — наименования биопредприятия, наименования препарата, номера серии и контроля, даты изготовления (мес., год), срока годности, количества коммерческих доз, способа применения, условий хранения.

Порядок применения: Вакцину применяют с профилактической целью для иммунизации клинически здоровых животных и лечения дерматомикозов у клинически больных.

Вакцина Поливак-ТМ применяется при дерматофитозах собак, возбудителями которых являются грибы родов Трихофитон и Микроспорум.

Перед применением вакцины все поголовье собак должно быть клинически осмотрено. Не разрешается прививать животных с повышенной температурой и больных инфекционными заболеваниями.

Перед применением флакон или ампулу с вакциной встряхивают. Вакцину вводят внутримышечно в область лопатки, груди, шеи или заднебедренной группы мышц двукратно с интервалом между введениями 10-14 сут. в профилактической дозе 0,3 см³ согласно наставлению. Кожу на месте введения дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом или 0,5%-ным раствором карболовой кислоты. Шприцы и иглы перед применением стерилизуют кипячением, для вакцинации каждого животного используют отдельную иглу.

Способ лечения: Дву- и трехкратное введение вакцины с интервалом 10-14 дней в лечебной дозе 0,5-0,6 см³ согласно наставлению.

Для ускорения отторжения корочек пораженные участки кожи рекомендуется обрабатывать размягчающими средствами — рыбьим жиром, ланолином, вазелином и другими минеральными или растительными маслами, используемыми в медицине и ветеринарии.

При вакцинации здоровых собак изменений в клиническом состоянии не наблюдается. У отдельных особей отмечается небольшой отек и воспаление на месте введения вакцины, который самопроизвольно исчезает без лечебного вмешательства спустя 3-4 дня.

При вакцинации животных, находящихся в инкубационном периоде заболевания, прививка ускоряет проявление клинической картины дерматомикоза с возникновением множественных очагов поверхностного характера. Животным, проявившим клинические признаки болезни, необходимо вводить лечебную дозу вакцины, а в особо тяжелых случаях вводить вакцину 3-4 раза. Интервал между введениями вакцины 10-14 суток.

Иммунитет у привитых животных наступает через 20-30 сут. после второй вакцинации и сохраняется не менее 12 месяцев с момента первого введения вакцины.

Учитывая, что введение вакцины животным, находящимся в инкубационном периоде болезни, ускоряет клиническое проявление дерматомикозов, необходимо в неблагополучных по дерматомикозам питомниках и других предприятиях проводить поголовную вакцинацию в лечебных дозах. У слабых истощенных собак, у собак, имеющих нарушение обмена веществ и пораженных эктопаразитами, профилактическая и лечебная эффективность вакцины снижается.

Перегруппировка и транспортирование животных в благополучных по дерматомикозам питомниках и других предприятиях разрешается без ограничений через 14 дней после вакцинации. Всех вновь поступивших животных вакцинируют в период их карантинирования.

После окончания прививок составляют акт с указанием даты, количества иммунизированных животных, эпизоотического состояния хозяйства, номера серии вакцины, срока годности и даты изготовления, предприятия-изготовителя, а также лиц, проводивших вакцинацию. В акте также указывается количество биопрепарата и дезинфектанта,

израсходованных на вакцинации.

Срок годности вакцины: 18 месяцев со дня изготовления при условии хранения ее при температуре от 2 до 10 °С.

При отсутствии маркировки, нарушении целостности флаконов, изменении цвета, наличии неразбивающихся хлопьев, посторонних примесей флаконы с вакциной обеззараживают кипячением в течение 15 минут.

Производитель: НАРВАК НПО, Россия

Упаковка: 10 флаконов по 0,6 мл (10 доз)

Единица отпуска товара: 1 флакон 0,6 мл (1 доза)