

Раствор для инъекций Ивервексан 1%

СОСТАВ

1мл препарата содержит в качестве действующего вещества 10 мг ивермектина.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ивервексан раствор для инъекций 1%предназначен для профилактики и лечения крупного рогатого скота ,мелкого рогатого скота ,лошадей ,свиней ,кроликов ,собак ,кошек при заболеваниях ,вызванных нематодами ,вшами ,личинками оводов ,клещами и другими членистоногими.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Ивервексан раствор для инъекций 1%назначают в следующих дозах:

- крупный рогатый скот:1мл/50 кг массы тела(эквивалентно 200 мкг ивермектина/кг массы тела)однократно ,подкожно в область шеи;
- для лечения клинической формы и профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота препарат вводится внутривенно в области верхней трети шеи животного в дозе 0,2 мл на животное.
- мелкий рогатый скот:0,5 мл/25 кг массы тела(эквивалентно 200 мкг ивермектина/кг массы тела)однократно ,подкожно в бесшерстную часть локтевой складки или подкожную складку в области затылка;
- лошадям:1мл/50 кг массы тела(эквивалентно 200 мкг ивермектина/кг массы тела)однократно,подкожно в область шеи;
- свиньи:1 мл/33 кг массы тела(эквивалентно 300 мкг ивермектина/кг массы тела)однократно,подкожно в область основания уха;
- кролики:0,1 мл/5 кг массы тела(эквивалентно 200 мкг ивермектина/кг массы тела)однократно,подкожно;
- собаки:0,2-0,4 мл/10 кг массы тела (эквивалентно 200-400 мкг ивермектина/кг массы тела)однократно,подкожно;
- кошкам:0,02-0,04 мл/1кг массы тела(эквивалентно 200-400 мкг ивермектина/кг массы тела)однократно,подкожно.

В тяжелых случаях (при саркоптозе,саркоптоидозе,псороптозе и т.п.).Ивервексан раствор для инъекций 1%применяют двукратно с интервалом 7-10 суток.

Не следует вводить более 10 мл препарата в одно место.Вслучае необходимостинужно разделить дозу.При использовании препарата необходимо соблюдать правила асептики и антисептики.

Перед массовыми обработками каждую серию препарата Ивервексан раствор для инъекций 1%испытывают на небольшой группе (5-7 голов)животных,и если в течении 3 суток не отмечается каких-либо осложнений,препарат применяют всему поголовью.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Убой крупного и мелкого рогатого скота, лошадей разрешается не раньше, чем через 21 сутки, свиней через 28 суток после введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным. Молоко для пищевых целей следует использовать не ранее, чем через 28 суток после последнего применения препарата. До истечения указанного срока молоко скармливают животным после кипячения.

Мясо и молоко от животных, коротым Ивервексан раствор для инъекций 1% ввели внутривенно однократно в дозе 0,2 мл на животное, используют без ограничений.