

## СЕРЕНИЯ

раствор для инъекций

рег. №: ПВИ-2-5.8/02448 от 12.08.2008

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный, светло-желтого цвета.

1 мл

маропитанта цитрат 10 мг

Вспомогательные вещества: метакрезол, сульфобутиловый эфир  $\beta$ -циклодекстрина натрия, вода.

Расфасован по 20 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Каждый флакон упаковывают в картонную коробку и снабжают инструкцией по применению.

Коробки и флаконы маркируют на русском языке с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа введения лекарственного средства, объема раствора во флаконе, наименования и содержания действующего вещества, условий хранения, номера серии, срока годности, информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации, надписей «Для животных» и «Стерильно».

Свидетельство о регистрации № ПВИ-2-5.8/02448 от 12.08.08

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты

Противорвотный препарат, антагонист нейрокининовых рецепторов (NK1) и ингибирует связывание субстанции P, нейтропептида тахикининовой группы в ЦНС. Маропитант эффективен при рвоте как центрального, так и периферического генеза.

После п/к введения маропитант быстро всасывается, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 45 мин. Биодоступность составляет 90%. Связывание с белками плазмы - 99%.

По степени воздействия на организм маропитант цитрат относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Показания к применению препарата СЕРЕНИЯ

— для предотвращения рвоты различного генеза у собак.

Порядок применения

Препарат вводят собакам п/к в дозе 1 мг/кг массы животного, что эквивалентно 1 мл препарата на 10 кг массы животного 1 раз/сут в течение не более чем 5 сут.

Побочные эффекты

При применении Серения в соответствии с показаниями и рекомендуемыми дозами побочных реакций и осложнений не отмечается.

Противопоказания к применению препарата СЕРЕНИЯ

- беременные животные;
- лактирующие животные.

#### Особые указания и меры личной профилактики

Серению можно назначать одновременно с НПВС, антибиотиками, противопаразитарными препаратами.

При применении Серении следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Запрещается во время работы принимать пищу и воду. После работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного средства для бытовых целей.

#### Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и не доступном для посторонних лиц месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 3° до 25°С. Срок годности - 2 года.

После первого вскрытия флакона Серению можно использовать в течение 90 дней.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.