

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А.ВЛАСОВ  
09 ОКТ 2014

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп - цистит<sup>®</sup> таблеток для лечения и профилактики воспалительно-инфекционных болезней мочевыводящих путей и мочекаменной болезни у кошек и собак

(организация - разработчик: ООО «АПИ-САН», г. Москва)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетки (Stop-cystitis tabulettae).

Международное непатентованное наименование: нитроксолин, дротаверин, горца птичьего экстракт, крапивы листьев экстракт, березы листьев экстракт, хвоща полевого травы экстракт, бруслики листьев экстракт, солодки корней экстракт.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетки выпускают в двух модификациях:

Наименование сырья	Количество мг/табл.	
	Стоп - цистит <sup>®</sup> таблетки для кошек (120 мг)	Стоп - цистит <sup>®</sup> таблетки для собак (200 мг)
Действующие вещества		
Нитроксолин	12,5	25,0
Дротаверина гидрохлорид	10,0	30,0
Экстракт хвоща	10,0	10,0
Экстракт горца птичьего	10,0	10,0
Экстракт листьев крапивы	10,0	10,0
Экстракт корня солодки	10,0	10,0
Экстракт листьев бруслики	10,0	10,0
Экстракт листьев березы	10,0	10,0
Вспомогательные вещества		
Карбоксиметилцеллюлоза	23,65	61,9
Натрия гликолят крахмала	7,2	12,0
Кальция стеарат	1,2	2,0
Поливинилпирролидон	4,2	7,0
Оболочка «Opadry»	1,25	2,1

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой таблетки круглой формы, покрытые оболочкой зеленого цвета.

3. Выпускают Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетки по 15 или 20 штук , расфасованным в полимерные банки, укупоренные пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия. Банки упаковывают поштучно в картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 10°C до 25°C.

Срок годности Стоп - цистит® таблеток при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства.

Запрещается применение Стоп - цистит® таблеток по истечении срока годности.

5. Стоп - цистит® таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

## II. Фармакологические свойства

7. Стоп - цистит® таблетки относятся к группе комбинированных противомикробных лекарственных препаратов.

Стоп - цистит® таблетки обладают противомикробным, противовоспалительным, спазмолитическим, диуретическим и салуретическим действием.

Нитроксолин, входящий в состав лекарственного препарата, является производным 8-оксихинолина, активен в отношении широкого спектра грамположительных, грамотрицательных бактерий и некоторых грибов, вызывающих инфекции мочевых путей, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Ureaplasma urealyticum*, *Corynebacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* После приема внутрь быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выводится почками в неизмененном виде. В моче определяются высокие концентрации нитроксолина.

Дротаверина гидрохлорид оказывает продолжительное спазмолитическое, миотропное и сосудорасширяющее действие, устраняет спазмы гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и тенезмы мочевого пузыря. Максимальная концентрация в сыворотке крови при пероральном применении регистрируется на 45 – 60-й мин. Метаболизм препарата проистекает в печени. Период биологического полураспада – 16 - 22 час. За 72 час практически выводится из организма, приблизительно 30% с мочой, а 50% – с калом. В основном выводится в виде метаболитов, в неизмененном виде в моче не определяется.

Комплекс биологически активных компонентов лекарственных растений (флавоноиды, эфирные масла, дубильные вещества, витамины, минеральные соединения) обладает антисептическими, мочегонными, спазмолитическими и противовоспалительными свойствами, способствуют выведению конкрементов при мочекаменной болезни.

Стоп-цистит® таблетки по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.07-76), в рекомендуемых дозах препарат не оказывает местно - раздражающего и сенсибилизирующего действия.

## III. Порядок применения

8. Стоп-цистит® таблетки назначают собакам и кошкам для лечения и профилактики острых и хронических воспалительно-инфекционных болезней мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, уретрит) и мочекаменной болезни, профилактики инфекций после диагностических процедур и в послеоперационный период после удаления мочевых камней.

9. Противопоказанием к применению является острая сердечная и печеночная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствительность животного к

компонентам препарата. Беременным и лактирующим животным препарат следует применять после консультации с лечащим ветеринарным врачом.

10. Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетки применяют животным индивидуально с кормом или вводят непосредственно на корень языка с лечебной целью два раза в сутки, с профилактической один раз в сутки в течение 5-7 дней, в следующих дозах:

Вид и масса животного		Разовая доза Стоп - цистит <sup>®</sup> таблеток на животное	
		«для кошек»	«для собак»
кошки	до 5 кг	1	-
	от 5 кг	1 ½	-
собаки	до 10 кг	-	1
	от 10 до 20 кг	-	1 ½
	от 20 до 30 кг	-	1 ½ -2
	от 30 до 40 кг	-	2-3
	свыше 40 кг	-	3-4

Продолжительность курса применения лекарственного препарата определяет лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. При первом применении лекарственного препарата у животного может наблюдаться обильное слюнотечение.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций использование Стоп - цистит<sup>®</sup> таблеток следует прекратить.

15. Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетки совместим с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавками.

16. Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе со Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетками следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп - цистит<sup>®</sup> таблетками. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Инструкция разработана ООО «АПИ-САН» (117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп - цистит<sup>®</sup> таблеток, утвержденная Россельхознадзором 22 августа 2013 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: