

## ФЛЕКСОПРОФЕН 2,5 % раствор для инъекций (10 мл)

### **Состав и форма выпуска**

ФЛЕКСОПРОФЕН® 2,5%, 5% или 10% инъекционный раствор содержит в 1 мл в качестве действующего вещества соответственно 25, 50 или 100 мг кетопрофена.

### **Фармакологические свойства**

Кетопрофен, входящий в состав ФЛЕКСОПРОФЕНА® обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием, эффективен для лечения острых, подострых и хронических воспалений, сопровождающихся симптомом боли. Механизм действия препарата заключается в подавлении синтеза простагландинов, путем нарушения метаболизма арахидоновой кислоты. При внутримышечном введении максимальная концентрация кетопрофена в плазме крови отмечается через 30 минут. Биодоступность препарата варьирует от 85% до 100%. Кетопрофен из организма выводится преимущественно через почки.

В рекомендуемых дозах препарат не оказывает сенсibiliзирующего действия и не кумулируется в организме.

### **Показания к применению**

Лечение воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, вывихи, отеки, синовиты, теносиновиты и т.п.), болевого синдрома различной этиологии (травматическая и послеоперационная боль, колики), а также гипертермии у лошадей, телят, собак и кошек.

### **Режим дозирования.**

Лошади: внутривенно в дозе 2,2 мг/кг действующего вещества, 1 раз в день, в течение 1-5 дней.

Телята: внутривенно или внутримышечно в дозе 3 мг/кг действующего вещества, 1 раз в день, в течение 1-5 дней.

Собаки, кошки: подкожно, внутримышечно, внутривенно в дозе 2 мг/кг действующего вещества, 1 раз в день, в течение 1-5 дней.

### **Противопоказания**

Противопоказанием к применению ФЛЕКСОПРОФЕН® является аллергия к кетопрофену и близким к нему средствам, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрагический синдром, выраженная печеночная и почечная недостаточность, беременность.

### **Особые указания**

ФЛЕКСОПРОФЕН® не рекомендуется применять совместно с другими нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами, глюкокортикоидами и антикоагулянтами. Не смешивать с другими лекарственными средствами в одном шприце.

Убой телят на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток после последнего применения лекарственного средства. Мясо вынужденно убитых животных до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления животных или для производства мясокостной муки.

### **Условия и сроки хранения**

Хранят ФЛЕКСОПРОФЕН® с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления.