



Е. А. НЕПОКЛОНОВ

25 ИЮН 2014

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Фиприст® Спрея для борьбы  
с эктопаразитами собак и кошек  
(организация-разработчик "KRKA d.d., Novo Mesto", Словения)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фиприст® Спрей (Fipryst Spray).  
Международное непатентованное наименование: фипронил.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.  
Фиприст Спрей в качестве действующего вещества содержит фипронил – 0,25% и вспомогательные вещества: коповидон – 2%, изопропанол – 80% и воду очищенную – до 100%. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.
3. Выпускают Фиприст® Спрей расфасованным в полиэтиленовые флаконы с распылительной головкой по 100, 250 и 500 мл.
4. Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и источников огня, при температуре от 0 °С до 25 °С.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения и транспортирования – 3 года с даты производства. Запрещается использовать препарат по истечении срока годности.
5. Фиприст® Спрей следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

7. Фиприст® Спрей относится к инсектоакарицидным препаратам группы фенилпирозолов.

Активен в отношении всех фаз развития вшей, блох, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожно-волосистой покров фипронил практически не всасывается в системный кровоток, накапливается в шерсти, эпидермисе, волосистых луковицах и сальных железах тела животного, оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие, обеспечивая защиту животного от эктопаразитов.

Защитное действие препарата после обработки собак против иксодовых клещей продолжается до 5 недель, против насекомых – до 3 месяцев, после обработки кошек против блох – до 40 дней.

Фиприст® Спрей по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает

кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

8. Фиприст® Спрей назначают собакам и кошкам при энтомозах и поражении иксодовыми клещами.

9. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ингредиентам препарата (в том числе в анамнезе).

Запрещается применение Фиприст® Спрея больным инфекционными болезнями, выздоравливающим и ослабленным животным, а также щенкам и котятм моложе недельного возраста.

10. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами. Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы, которые снимают после полного высыхания шерстного покрова.

Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхивают и, держа его вертикально, нажимают на распылительную головку, направляя струю аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-20 см. Доза препарата в зависимости от длины шерсти составляет 3-6 мл на 1 кг массы животного.

Препарат легко дозируется:

- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 100 мл обеспечивает дозу препарата 0,5 мл;

- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 250 мл обеспечивает дозу препарата 1,5 мл;

- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 500 мл обеспечивает дозу препарата 3,0 мл.

Спреем обрабатывают все туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть (у животных длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой). Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, кончиками пальцев (в перчатке) препарат слегка втирают вокруг глаз и носа.

В целях предотвращения повторной инфекации животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

До полного высыхания шерсти не следует подпускать обработанное животное к открытому огню и нагревательным приборам.

Не рекомендуется мыть животное за 2 дня до обработки, а также мыть и купать в открытом водоеме в течение 2 дней после обработки Фиприст® Спреем.

11. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством, животному назначают средства симптоматической терапии.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и назначить животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Фиприст® Спрей не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

16. Фиприст® Спрей не предназначен для обработки продуктивных животных.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При обработке животных Фиприст® Спреем следует использовать резиновые перчатки. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.

18. В течение 2 суток после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Фиприст® Спреем. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом; при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Запрещается использовать пустые флаконы из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель «KRKA d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovenija.

Инструкция разработана фирмой «KRKA d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovenija. Адрес Представительства: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13/43, 6 этаж.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию, утвержденную Россельхознадзором 09.11.2012 года.