ЭМИЦИДИН (30 капсул х 50 мг)

Эмицидин - производное 3- оксипиридина и янтарной кислоты.
Является водо-растворимым антиоксидантом нового поколения, обладающий выраженным антигипоксическим эффектом.

Эмицидин относится к группе антиоксидантов и является ингибитором свободно-радикальных процессов в организме. Обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами, оказывает лечебное и профилактическое действие при гипоксиях различной этиологии. Механизм действия заключается в способности Эмицидина уменьшать процессы перекисного окисления липидов в мембранах клеток, связывать свободные радикалы, специфически влиять на энергетический обмен, увеличивая степень знергизации клеток, повышать устойчивость организма к кислородной недостаточности.

Показания к применению
Назначают мелким животным с лечебной или профилактической целью самостоятельно, а также в составе комплексной терапии при патологических состояниях, сопровождающихся гипоксией (кислородной недостаточностью} органов и тканей:
• Острых и хронических сердечных заболеваниях
• Нервных срывах, стрессовых перегрузках
• Расстройствах ЖКТ
• Гипоксии
• Эпилепсии (с основными терапевтическими средствами)
• Наркозных и постнаркозных осложнениях
• Интоксикациях различной этиологии
• Гнойно-воспалительных процессах
• В послеоперационный период
• В восстановительный период

Эмицидин сочетается с антибиотиками, антгельминтиками, витаминами и другими препаратами.

Дозировка:
Перорально: собакам крупных пород – по 2 капсулы (50 мг) два раза в день в течение 10 дней, затем по 1 капсуле (50 мг) два раза в день – еще 10 дней. Собакам средних пород – по 1 капсуле (50 мг) или по две капсулы (15 мг), собакам мелких пород, кошкам и мелким животным – в дозе 15 мг.
Птицам , грызунам эмицидин назначают как в инъекционной, так и в оральной форме (2-5 капель 2 раза в день).

Побочных эффектов после применения эмицидина не установлено.