

ЭМИЦИДИН (30 капсул x 15 мг)

Эмицидин - производное 3- оксипиридина и янтарной кислоты.

Является водо-растворимым антиоксидантом нового поколения, обладающий выраженным антигипоксическим эффектом.

Эмицидин относится к группе антиоксидантов и является ингибитором свободно-радикальных процессов в организме. Обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами, оказывает лечебное и профилактическое действие при гипоксиях различной этиологии. Механизм действия заключается в способности Эмицидина уменьшать процессы перекисного окисления липидов в мембранах клеток, связывать свободные радикалы, специфически влиять на энергетический обмен, увеличивая степень энергизации клеток, повышать устойчивость организма к кислородной недостаточности.

Показания к применению

Назначают мелким животным с лечебной или профилактической целью самостоятельно, а также в составе комплексной терапии при патологических состояниях, сопровождающихся гипоксией (кислородной недостаточностью) органов и тканей:

- Острых и хронических сердечных заболеваниях
- Нервных срывах, стрессовых перегрузках
- Расстройствах ЖКТ
- Гипоксии
- Эпилепсии (с основными терапевтическими средствами)
- Наркозных и постнаркозных осложнениях
- Интоксикациях различной этиологии
- Гнойно-воспалительных процессах
- В послеоперационный период
- В восстановительный период

Эмицидин сочетается с антибиотиками, антгельминтиками, витаминами и другими препаратами.

Дозировка:

Перорально: собакам крупных пород – по 2 капсулы (50 мг) два раза в день в течение 10 дней, затем по 1 капсуле (50 мг) два раза в день – еще 10 дней. Собакам средних пород – по 1 капсуле (50 мг) или по две капсулы (15 мг), собакам мелких пород, кошкам и мелким животным – в дозе 15 мг.

Птицам, грызунам эмицидин назначают как в инъекционной, так и в оральной форме (2-5 капель 2 раза в день).

Побочных эффектов после применения эмицидина не установлено.