

# АМИТ РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## Состав и фармакологические свойства.

Содержит в качестве действующего вещества амитраз, являющийся акарицидом контактного действия, активен в отношении саркоптоидных и демодекозных клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Входящие в состав препарата вспомогательные вещества способствуют уменьшению воспалительных процессов, активизируют заживление поврежденных тканей.

## Показания к применению.

Саркоптоз, нотоэдроз, демодекоз и отодектоз собак и кошек.

## Противопоказания.

Не подлежат обработке больные инфекционными заболеваниями и выздоравливающие животные, беременные и кормящие самки, а также щенки и котята моложе 2-месячного возраста.

## Дозы и порядок применения.

При поражении животных демодекозом, саркоптозом, нотоэдрозом «Амит» наносят тонким слоем на предварительно очищенные от струпьев и корок пораженные места, равномерно распределяя его от периферии к центру очага поражения, с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см. Обработку проводят 2–5 раз с интервалом в 5 дней до клинического выздоровления животного, подтвержденного двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

При отодектозе (ушной чесотке) наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок тампоном, смоченным лосьоном для очистки ушей «Барс», а затем закапывают в каждое ухо по 3–6 капель препарата (в зависимости от размера животного). Ушную раковину складывают пополам и в течение одной минуты слегка массируют ее основание. Препаратом обязательно обрабатывают оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного. Обработку проводят двукратно с интервалом в 3–5 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

## Особые указания.

Обработку животного проводить в резиновых перчатках. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть водой. Не следует гладить и допускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

По окончании работы руки следует тщательно вымыть теплой водой с мылом.

## Побочные явления.

При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату могут появиться признаки раздражения кожи.

## Хранение.

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

## Форма выпуска.

Полимерный флакон-капельница 20 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка.