

ИНСПЕКТОР (Inspector Total C) Капли на холку для собак массой 40-60 кг (1 пипетка х 6 мл)

Инструкция по применению

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торговое наименование лекарственного препарата: Инспектор Тотал С (Inspector Total C).

Международное непатентованное наименование: фипронил, моксидектин.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инспектор Тотал С в 1 мл в качестве действующих веществ содержит фипронил - 100 мг и моксидектин - 25 мг, а в качестве вспомогательных веществ: спирт изопропиловый, диметилсульфоксид, полиэтиленгликоль. По внешнему виду представляет собой прозрачную маслянистую бесцветную или светло-жёлтого цвета жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения — 3 года со дня производства.

Инспектор Тотал К по истечении срока годности не должен применяться.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до 30 °С.

Инспектор Тотал К следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

ФАКРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Инспектор Тотал С относится к группе инсектоакарицидных и антигельминтных препаратов.

Инспектор Тотал С обладает широким спектром противопаразитарного действия, активен в отношении паразитирующих у собак демодекозных (*Demodex canis*), саркоптоидных (*Sarcoptes canis*), отдекозных (*Otodectes spp.*) и иксодовых (*Ixodes spp.*) клещей, блох (*Ctenocephalides spp.*), вшей (*Linognathus spp.*), власоедов (*Trichodectes spp.*), личиночных и половозрелых фаз развития кишечных нематод, включая (*Toxocara spp.*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Trichuris spp.*), а также личиночных форм сердечных гельминтов (*Dirofilaria immitis*).

Фипронил, входящий в состав препарата, относится к группе фенилпиразольных соединений, механизм действия которых основан на торможении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых хлоридных каналах членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к гибели клещей и насекомых.

Моксидектин является полусинтетическим соединением из группы милбемицинов. Оказывая стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь с постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод.

Инспектор Тотал С по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местно-раздражающего, сенсibiliзирующего и резорбтивно-токсического действия.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Инспектор Тотал С назначают собакам для лечения и профилактики энтомозов, демодекоза,

отодектоза, саркоптоза, при поражении иксодовыми клещами, кишечных нематодозов (токсокароз, токсамариоз, унцинариоз, анкилостомоз), а также в целях профилактики дирофиляриоза.

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Инспектор Тотал С запрещается применять щенкам моложе 7-недельного возраста, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

Обработку животных массой менее 1 кг, беременных и кормящих животных следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

Препарат применяют животным путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу. Перед использованием у пипетки отламывают верхнюю часть. Препарат, раздвинув шерсть, наносят животному в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи.

При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 3-4 места.

В зависимости от массы собак используют препарат Инспектор Тотал С в дозах:

Масса животного / Доза препарата, мл

25 кг / 4

При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют в дозе 0,1 мл на каждый кг массы животного, используя комбинации пипеток различной фасовки.

Для уничтожения иксодовых клещей, блох, вшей и власоедов обработку животных проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии - один раз в четыре-шесть недель на протяжении всего сезона активности насекомых и клещей.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного лекарственный препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже.

Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют однократно. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные средства.

При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

С лечебной целью при саркоптозе препарат применяют двукратно, при демодекозе - 2-4-кратно с интервалом 28 дней. При необходимости курс лечения повторяют. В целях профилактики возможной инвазии обработку проводят один раз в месяц.

Для дегельминтизации животных при нематодозах желудочно-кишечного тракта препарат применяют с лечебной целью однократно, с профилактической - один раз в месяц.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах, препарат применяют в весенне-летне-осенний период: перед началом лета насекомых от комаров и москитов (переносчиков возбудителя *D. Immitis*) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне не ранее, чем за 1 месяц после завершения лета насекомых. Инспектор Тотал С не уничтожает половозрелых дирофилярий, но снижает количество циркулирующих в крови микрофилярий, и может быть применен также и инвазированным животным.

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, животное не следует мыть в течение 4 суток после обработки препаратом.

Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата Инспектор Тотал С в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

Не следует применять Инспектор Тотал С одновременно с лекарственными средствами, содержащими макроциклические лактоны.

Инспектор Тотал С не предназначен для применения продуктивным животным.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с препаратом Инспектор Тотал С следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Не следует подпускать детей к животному в первые 2-3 дня после обработки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При необходимости обработку собак породы колли, бобтейл и шелти (ввиду повышенной чувствительности собак этих пород к макроциклическим лактонам) следует проводить после консультации с ветеринарным врачом.