



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-стресс капель для снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений поведения, а также для профилактики укачивания у собак и кошек

(организация-производитель ООО НПО «Апи-Сан», Московская область)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп-стресс капли (Stop-stress drops).

Международное непатентованное наименование: фенибут (аминофенилмасляная кислота) + экстракты лекарственных растений (мяты кошачьей, пустырника, хмеля, шлемника байкальского).

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Стоп-стресс капли содержат в 1 мл в качестве действующих веществ: фенибут – 100 мг и комплекс экстрактов лекарственных растений: мяты кошачьей, пустырника, хмеля, шлемника байкальского – по 20 мг, а также вспомогательные компоненты: аспасвит – 7 мг глицерин – 0,7 мл и воду дистиллированную – до 1 мл.

3. Препарат расфасовывают в полиэтиленовые или стеклянные флаконы с пробкой-капельницей, уложенные в картонные пачки. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Стоп-стресс капли хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0⁰С до 25⁰С.

5. Стоп-стресс капли следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата не требуется.

II. Фармакологические свойства

7. Стоп-стресс капли относятся к комбинированным седативным лекарственным средствам.

Фенибут, входящий в состав препарата, является фенильным производным ГАМК и фенилэтиламина (γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлорид). Усиливая тормозящие ГАМК-эргические процессы, воздействует на функциональное состояние за счет нормализации метаболизма и влияния на мозговое кровообращение. Обладая выраженным стресс-корректорным действием, обеспечивает нормализацию процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Комплекс экстрактов лекарственных растений оказывает на животных мягкое успокаивающее действие.

Комбинация активных компонентов Стоп-стресс капель оказывает на животных успокаивающее действие, уменьшает напряженность, страх, улучшает

восстановительные и адаптивные процессы, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Стоп-стресс капли по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают мутагенного, канцерогенного и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Стоп-стресс капли назначают для снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений поведения у кошек и собак при стрессах, фобиях, агрессии без видимых причин и при повышенном половом возбуждении (совместно с контрацептивными лекарственными средствами).

9. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет. Не следует применять препарат беременным и лактирующим самкам.

10. Стоп-стресс капли применяют кошкам и собакам перорально принудительно на корень языка (или в защечный мешок) или с небольшим количеством лакомства, с учетом массы, типа нервной деятельности и степени возбуждения животного, в следующих суточных дозах:

кошкам - 1 капля препарата (5 мг по ДВ) на 1 кг массы животного;

собакам - 2 капли препарата (10 мг по ДВ) на 1 кг массы животного.

Суточную дозу препарата делят на два приема и задают животному утром и вечером.

Примерные дозы Стоп-стресс капель в зависимости от вида и массы животного представлены в таблице:

Вид и масса животного	Доза препарата, капель/животное	
	Суточная	Разовая
Кошки, собаки до 4 кг	2-8	1-4
Кошки, собаки от 4 до 8 кг	5-16	2-8
Собаки массой от 8 до 12 кг	16-24	8-12
Собаки массой от 12 до 20 кг	12-40	6-20

Курс применения препарата составляет 15-20 дней. При наличии признаков сильного возбуждения и психогенных нарушений поведения (агрессия, страх, гиперактивность, чрезмерная вокализация (лай, мяуканье), гиперсексуальное поведение, мечение помещения мочой) курс может быть продлен до 4-х недель.

При повторном проявлении у животных признаков возбуждения и/или нарушений поведения курс применения препарата повторяют в тех же дозах по той же схеме.

В целях профилактики стрессов (транспортировка, приход гостей, смена обстановки, отъезд хозяина, участие в выставках и соревнованиях) препарат применяют за 3-5 дней до предполагаемого мероприятия и в течение 1 - 4 дней после его окончания.

Для коррекции поведения при повышенной половой активности Стоп-стресс капли применяют в тех же дозах совместно с контрацептивными лекарственными средствами. Длительность курса применения зависит от индивидуальной чувствительности животных и степени их возбудимости.

11. При значительной передозировке у животного может наблюдаться сонливость, тошнота, рвота, снижение артериального давления, нарушение функции почек и желудочно-кишечного тракта. В этих случаях необходимо промыть желудок, назначить энтеросорбенты и симптоматические средства в соответствии с инструкциями по их применению.

12. В редких случаях, при первом приеме препарата у животного может наблюдаться сонливость и тошнота, которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата в редких случаях возможны сонливость или возбуждение, раздражительность, тошнота, аллергические реакции. В таких случаях применение препарата прекращают и назначают симптоматическую и десенсибилизирующую терапию.

15. Стоп-стресс капли при совместном применении усиливают и пролонгируют действие транквилизаторов, нейролептиков и противосудорожных средств.

16. Сроки использования продукции животноводства после применения Стоп-стресс капель не регламентируются.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе со Стоп-стресс каплями следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. Во время применения препарата запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его следует смыть струей проточной воды.

19. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей.

20. Организация-производитель ООО НПО «Апи-Сан», Московская обл., Балашихинский р-он, пос. Новый Милет, Полтевское шоссе, 4.

Инструкция разработана ООО «Апи-Сан» (117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д.3/1, кв. 222).

С вступлением в силу настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп-стресс капель, утверждённая Россельхознадзором 30 июня 2006 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».